

Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels, invasifs)

- *Cortaderia seloana* (*IP*) : Lande Saint Gabriel, Tourlaville (PM)

Légende : *IP* (invasive potentielle) en Basse-Normandie.

Observations de : AF : Alain Filliol, CR : Chantal Ronsin, CZ : Catherine Zambettakis, DB : Dominique Blais, DC : Daniel Chicouène, JC : Jean Collette, JG : Julien Geslin, LD : Loïc Delassus, LL : Laurent Lebot, MG : Maurice Gérard, MP : Michel Provost, OL : Olivier Launay, PM : Patrick Martin, RR : Rémy Ragot, SSt : Séverine Stauth, TB : Thomas Bousquet.

Erratum : *Trifolium patens* a été signalé par erreur dans E.R.I.C.A. n°21 à Baubigny ; l'espèce n'y a pas été observée.

MAYENNE

Liste rédigée par Bertrand JARRI

La parution de l'atlas floristique de la Mayenne étant prévue à la fin de l'année 2009, il est difficile de présenter un bilan des découvertes étoffé car le travail de rédaction est très important. Nous vous proposons néanmoins un survol rapide des observations majeures de l'année 2008.

Taxons à statut

- *Bromus madritensis* (*LR PdL*) : Redécouverte dans Château-Gontier (MR)
- *Buglossoides arvensis* (*LR PdL*) : Argentré, Montroux (HH)
- *Cardamine amara* (*PR, LRA*) : Moulin de Forge ST DENIS DE GASTINES (Gr. Bota)
- *Helleborus foetidus* (*LRA*) : St-Hilaire-du-Maine (DH)
- *Isopyrum thalictroides* (*PR, LRA*) : Ecluse de Montgiroux à Martigné-sur-Mayenne (FL)
- *Lathyrus tuberosus* (*LR PdL, LRA*) : Entrée de champ Bel-Air à Entrammes (MR)
- *Legousia speculum-veneris* (*LR PdL, LRA*) : Revu récemment. 4 pieds au bord de la route principale à Brée (MR).
- *Limosella aquatica* (*LR PdL, LRA*) : Frayère à sec le long de la Mayenne à Origné (JCL)
- *Nardurus maritimus* (*LR PdL*) : Mur dans le bourg de Cossé-en-Champagne (MR)
- *Petasites hybridus* : Les Etoyères à Saint-Cénére (HH)
- *Polypogon monspeliensis* (*LR PdL*) : Carrières de Voutré et de Torcé à Viviers-en-Charnie (MR).
- *Polypogon viridis* (*LR PdL*) : Nouveau taxon pour le département. Présence en lien avec les apports de sable pour fabrication de matériaux. Population abondante à Selle-Craonnaise, quelques pieds à Craon et à Changé (MR)
- *Ranunculus arvensis* (*LR PdL*) : Dans céréales à Meslay-du-Maine (MR)
- *Scandix pecten-veneris* subsp. *pecten-veneris* (*LR PdL, LRA*) : Champ d'orge envahi de cette Apiacée à La Motte à Maisoncelle (MR)

- *Sedum rubens* (LRA) : les Gravus à Louverné (HH)
- *Valerianella rimosa* (LR PdL) : Champ de blé à Meslay-du-Maine (MR) et Champéon (Gr. Bota)

Légende : PR (protection régionale), LRA (liste rouge armoricaine), LR PdL (liste rouge Pays de la Loire, 2008).

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe...)

- *Ammi majus* subsp. *majus* : Nouveau taxon pour le département. Belle population dans cultures autour de Laval-Changé. A noter la variété *glaucifolium* en mélange avec l'espèce type (MR)
- *Anacamptis pyramidalis* : les Gravus à Louverné (AA)
- *Arenaria serpyllifolia* : Nouveau taxon noté en plusieurs endroits tels que les murs, sols graveleux par exemple à Voutré, Evron, Louverné, St Berthevin-lès-Laval (MR)
- *Briza minor* : Messicole à Bel-Air à Entrammes et Les Landes à Brain-sur-les-Marches (MR)
- *Bromus secalinus* subsp. *secalinus* : les Landes à Brain-sur-les Marches et à Bierné (MR)
- *Chenopodium hybridum* : Les écorcés à Entrammes (MR)
- *Dittrichia graveolens* : les Gravus à Louverné (HH)
- *Galanthus nivalis* : Pauchard à Bonchamp (HH)
- *Monotropa hypopitys* : St-Georges-Buttavent, forêt de Mayenne (DH)
- *Orobanche rapum-genistae* : Couillé à Vaiges (Gr. Bota)
- *Polycarpon tetraphyllum* : Sur schiste affleurant dans une ruelle dans Renazé (MR)
- *Rhamnus cartharticus* : Vers Rigohaut à Argentré (HH)
- *Sanicula europea* : Torcé-Viviers-en-Charnie (HH, MR, AL)
- *Spiranthes spiralis* : allée du taillis à Bonchamp (HH)
- *Vicia bithynica* : la Grande Courteille à Bonchamp (PT)

Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels, invasifs)

- *Avena sterilis* subsp. *sterilis* : Nouveau taxon pour le département bien présent le long de la voie ferrée à Laval (MR)
- *Coronilla varia* : Sud du bourg à Brée (HH)
- *Lindernia dubia* (IA) : Frayère à sec le long de la Mayenne à Origné (JCL)
- *Potentilla recta* : les Gravus à Louverné (HH)
- *Rostraria cristata* (= *Lophochloa cristata*) : 2^{ième} donnée pour la Mayenne la Selle-Craonnaise (MR)
- *Sorghum halepense* : dans un champ de maïs à coté du bois de Bergault à Arquenay (JCL) ; bord de champ à la Davière à Saint-Berthevin-la-Tannière (MG).
- *Trifolium alexandrinum* : 1 pied à la marge de culture de tournesol à La Chesnaie à Bouère (MR)

Légende : IA (invasive avérée) en Pays de la Loire.

Observations de : AA - Anne Aurière ; AL - André Launay ; BJ - Bertrand Jarri ; DH - David Happe ; FL - Frédéric Levé ; Gr. Bota - Groupe botanique de Mayenne Nature Environnement ; HH - Hélène Hubert ; JCL - Jean-Claude Lebreton ; MG - Maurice Gérard ; MR - Marylène Ravet ; PT - Ph. Thevenin.