



Taxons à rechercher dans le Maine-et-Loire

(taxons ou stations non revus récemment)

nomCBNB (source RNFO)	Source	Milieu, lieu-dit	Communes
<i>Aconitum napellus</i>	Préaubert, 1924 à 1925	Ruisseau de la Filière	Soucelles
<i>Aconitum napellus</i>	Préaubert, 1924 à 1925	étang de Péné	Tiercé
<i>Adonis aestivalis</i> L.	Millet	Champs cultivés, prairies, pâture et colline du Petit-Trouvé (métairie). Calcaire d'eau douce.	Pontigné
<i>Adonis aestivalis</i> L.	Boreau	Champs des terrains calcaires	Saumur, Distré, Les Ulmes, Montreuil-Bellay, Passavant, Pontigné, Lasse, etc
<i>Allium neapolitanum</i> Cirillo	Préaubert	Vignes	Entre le Champ et Rablay, Nord de Saint-Aubin-de-Luigné
<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i> var. <i>deseglisei</i> (Boreau) Martrin-Donos	Boreau	Champs et vignes des terrains calcaires	Chalonnnes
<i>Althaea cannabina</i> L.	Boreau	Haies et lieux frais	Côteaux du Thouet près de Montreuil-Bellay ; Le breuil
<i>Althaea cannabina</i> L.	Millet	bords du Thouet	Le Puy-Notre-Dame
<i>Alyssum minus</i> (L.) Rothm.	FVMA	Fourneau	Liré
<i>Ammi majus</i> L. subsp. <i>majus</i> var. <i>intermedium</i> (DC.) Gren. & Godr.	Boreau	Champs	
<i>Androsace maxima</i>	Préaubert, 1902	route de Montreuil-Bellay à Loudun, entre les bornes kilométriques 46k,2 et 46k,3	
<i>Androsace maxima</i> L.	Millet	Moissons	Le Puy-Notre-Dame
<i>Androsace maxima</i> L.	Millet	Plaine de Montreuil, située à la porte de la ville ; elle est connue dans le pays sous le nom de Champagne ou Champagne de Montreuil	Montreuil-Bellay
<i>Androsace maxima</i> L.	Boreau	Champs des terrains calcaires	Montreuil-Bellay, Le puy, Fontevrault
<i>Anemone apennina</i> L.	Préaubert, 1930 à 1931	château de Beauvoyer (dans le parc)	Villebernier
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>villosum</i> Loisel. ex DC.	Boreau	Pelouses, bois	Angers, Forêt de longuenée, Beaulieu
<i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl.	Boreau	Bords des étangs et flaques d'eau	Juigné-sur-Loire, Bécon, Chazé-henri, Angrie, La Prévrière, La Cornuaille, Étang de la clémencière
<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag. var. <i>ochreatum</i> (DC.) Bab.	Boreau	Pelouses mouillées, petits ruisseaux	

<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Boreau	Bords des étangs et marais	Étang de Chaloché à , Étang de Chaumont à , Landes de Seiches à , Brezé, Bords de la Dive
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Millet	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye	La Breille
<i>Asclepias syriaca</i> L.	Boreau		Iles de la Loire, Saint-remy, Chalonnes, etc
<i>Asperula arvensis</i> L.	Millet		Brezé
<i>Asperula arvensis</i> L.	Millet		Cisay ou Cizay-la-Madeleine
<i>Asperula arvensis</i> L.	Millet	Fourneux et ses environs	Dampierre
<i>Asperula arvensis</i> L.	Millet	Champs cultivés	Distré
<i>Asperula arvensis</i> L.	Millet	Champs sablonneux entre Riou et Pocé	Rou-Marson
<i>Asperula arvensis</i> L.	Boreau	Moissons des terrains calcaires	Saumur, Baugé, Bauné
<i>Asplenium septentrionale</i>	Préaubert, 1906 à 1908	rochers des bords de l'Evre, près de la ferme de la Grande-Ecorcière	Botz-en-Mauges
<i>Asplenium x alternifolium</i> Wulfen	ERICA n°12		La Renaudière
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman	Millet	Village des Fourneaux, ses environs et jusqu'à la Chalouère	Angers
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman	Boreau	Champs	Aux fourneaux à Angers
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman	Préaubert		Rablay
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman	Millet	Buttes et landes de Terre-Fort. Terrain sablonneux plus ou moins couvert de bruyères	Saint-Hilaire-Saint-Florent
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman	Préaubert		Savennières
<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Boreau		Mazé, Longué
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. subsp. <i>imperfoliata</i> (L.f.) Franco & Rocha Afonso	Boreau	Pelouses humides	Marais de la Dive
<i>Blysmus compressus</i>	Préaubert, 1902	Moulin de la Motte, dans une pâture sourceuse, rive gauche du ruisseau de la Motte (Lg. O. 2G 68' 40" ; Lt. 52G 83' 97")	Pontigné
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link	Millet		petite pâture du carrefour de St-Martin-d'Arcé et de Grézillon
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link	Boreau	Lieux tourbeux	Saint-Martin-d'Arcé
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Boreau	Champs arides des terrains calcaires	Champigny-le-sec, Doué, Tigné, Chaloché, Durtal, Pontigné, Lasse
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Millet	lieux incultes, calcaires	Durtal
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Millet	Les bois du Roi et autres	Le Puy-Notre-Dame
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Millet	Terrains calcaires à Rochemenier	Louresse-Rochemenier
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Millet	Les environs de Chaloché	Marcé

<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Millet	La guerouas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain calcaire)	Martigné-Briand
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Millet	Plaine de Montreuil, située à la porte de la ville ; elle est connue dans le pays sous le nom de Champagne ou Champaigne de Montreuil	Montreuil-Bellay
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Millet		Souzay
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Millet	Les environs du château de Riou (terrain calcaire)	Tigné
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Millet		Fontaine-Milon
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Millet	Forêt de Fontevrault	Fontevrault
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Boreau	Lieux secs des terrains calcaires	Fontevrault, Champigny-le-sec, Milon, Baugé, Pontigné, Glacis des levées de la Loire, Saint-Ellier
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Millet		Parnay
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Millet	Les prés au bord de la Loire	Parnay
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Millet	Champs cultivés, prairies, pâture et colline du Petit-Trouvé (métairie). Calcaire d'eau douce.	Pontigné
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Millet	Lieux secs, incultes, près le moulin de la Roche	Pontigné
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Millet	Iles de la Loire	Saumur
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Millet		Souzay
<i>Bunias erucago</i> L.	Préaubert	gare des marchandises	Saumur
<i>Bupleurum aristatum</i>	Préaubert, 1906 à 1908	coteau calcaire du Moulin-Jumeau	Faye
<i>Bupleurum falcatum</i>	Préaubert, 1906 à 1908	Entre le bourg d'Antoigné et le village de Coulon	Antoigné
<i>Bupleurum falcatum</i>	Préaubert, 1906 à 1908	dans les garennes du Vaudelenay	Vaudelnay
<i>Bupleurum gerardi</i> All.	Millet	Coteaux de Servières (coteaux plantés en vignes)	Beaulieu
<i>Bupleurum gerardi</i> All.	Boreau	Côteaux arides	Beaulieu, Rochers de barré à
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet	Vignes et champs calcaires	Andard
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet	Les Blés, etc.	Brigné
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet	Terrain calcaire	Brion
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet		Brissac
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet	Terrain calcaire	Charcé
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet		Corzé
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet	La Chaillerie et ses environs	Corzé
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet	Terrain calcaire	Doué ou Doué-la-Fontaine
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet		Le Plessis-Grammoire
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet	Terrain calcaire	Les Alleuds ou Saint-Aubin-des-Alleuds
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet		Lué

<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet	La guerouas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain calcaire)	Martigné-Briand
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet		Pellouailles
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet	Localités diverses	Pontigné
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Boreau	Moissons, surtout dans les terrains calcaires	Saumur, Doué, Brissac, Saint-remy, Brion, Seiches, Tiercé, etc
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Millet	Champs près des fours à chaux	Vaudelnay-Rillé
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Millet		Antoigné
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Boreau	Lieux arides au midi	Le puy, Antoigné, Ça et là sur la levée, Villebernier, Les Rosiers, de Saumur à Montreuil-Bellay
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Millet		Le Puy-Notre-Dame
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Millet		Les Rosiers
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Millet	Talus de la Levée du Pont Fouchard, etc.	Saumur
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Millet		Souzay
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Millet		Varrains
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br. subsp. <i>sepium</i> var. <i>rosea</i> DC.	Boreau		
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Millet	les champs	Chavagnes ou Chavagnes-les-Eaux
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Millet	champs cultivés	Combrée
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Millet	champs cultivés, sableux	Corné
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Millet	bord de Loire	Denée
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Boreau	Champs de lin	Vallées de la Loire, Les Ponts-de-Cé, Murs, Rochefort, Chalonnes, Chavagnes, Noellet
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Boreau	Champs	Combrée, La Chapelle-sur-Oudon
<i>Campanula erinus</i> L.	Millet	Terrains calcaires	Aubigné ou Aubigné-Briand
<i>Campanula erinus</i> L.	Millet		Le Puy-Notre-Dame
<i>Campanula erinus</i> L.	Boreau	Lieux pierreux, calcaires	Le Puy-Notre-Dame, Montreuil, Doué, Aubigné, Les noyers,
<i>Campanula erinus</i> L.	Millet	La guerouas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain calcaire)	Martigné-Briand
<i>Campanula erinus</i> L.	Millet	Plaine de Montreuil, située à la porte de la ville ; elle est connue dans le pays sous le nom de Champagne ou Champaigne de Montreuil	Montreuil-Bellay
<i>Cardamine impatiens</i>	Préaubert, 1906 à 1908	vallée du Layon, au moulin de Gâteau	St-aubin de Luigné
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>paludosa</i> (Knaf) Celak.	Millet		Lasse

<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>paludosa</i> (Knaf) Celak.	Millet	Buttes de Rivet : petites carrières abandonnées, près des moulins de champs-fleuris, etc.	Les Ponts-de-Cé
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>paludosa</i> (Knaf) Celak.	Boreau	Lieux humides	Saint-georges, Vallée de la Loire, Lasse
<i>Carduus x stangii</i> H.Buek	Préaubert	falaise de la Grande-Guerche	St-Aubin de Luigné
<i>Carex arenaria</i> L.	Boreau	Lieux sablonneux	Sables de la vallée d'écoufflant
<i>Carex curta</i> Gooden.	Millet	Bords de l'étang de la Bosse-Noire (forêt de Cholet)	Cholet
<i>Carex curta</i> Gooden.	Millet	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye	La Breille
<i>Carex curta</i> Gooden.	Boreau	Lieux tourbeux	La Breille, Forêt de cholet, Saint-Macaire, Soucelles, de Angrie à Loiré
<i>Carex curta</i> Gooden.	Millet	Prairies tourbeuses de la métairie des Trois-Cheminées	Mouliherne
<i>Carex davalliana</i>	Préaubert, 1902	prairies marécageuses du Couesnon, immédiatement en aval du moulin de Choiselier, rive gauche (abondant) - (Lg. O. 2G 67' 75" ; Lt. 52G 83' 00")	Pontigné
<i>Carex davalliana</i> Sm.	Préaubert	Moulin de Choiselier	Pontigné
<i>Carex humilis</i>	Boreau, 1859	Coteau calcaire	Champigny le sec
<i>Carex humilis</i> Leyss.	Boreau	Côteaux calcaires	Champigny-le-sec
<i>Carex humilis</i> Leyss.	Millet	plateau de Champigny, avec <i>C. ginobasis</i>	Souzay
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	Millet	Lande du Mollet ; lande tourbeuse dépendant des fermes de la Julinière et de la Rainebaudais	Angrie
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	Boreau	Lieux tourbeux	Angrie, Landes du mollet
<i>Carex punctata</i> Gaudin	Millet	Petit bois séparé de l'étang de la Bouquetière par la chaussée	Echemiré ou Echemiré-Rigné
<i>Carex punctata</i> Gaudin	Boreau	Lieux humides	Echemiré, Bois de la bouquetière
<i>Carex rostrata</i> Stokes	Boreau	Marais tourbeux	Angrie, La Cornuaille, Saint-Sigismond, Echemiré, Forêt de chambiers, Petit étang des landes
<i>Carex rostrata</i> Stokes	Millet	Petit bois séparé de l'étang de la Bouquetière par la chaussée	Echemiré ou Echemiré-Rigné
<i>Carex rostrata</i> Stokes	Millet	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye	La Breille
<i>Carex umbrosa</i> Host	Boreau	Bois	Petite forêt de baugé
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv.	Boreau	Fossés, mares, fontaines	Sainte-Gemmes, Beaucouzé, Bouchemaine, Seiches, etc
<i>Centaurea aspera</i> L. subsp. <i>aspera</i>			

<i>Centaurea solstitialis</i> L. subsp. <i>solstitialis</i>	Boreau	Lieux arides	Le Puy-Notre-Dame, çà et là, Champs de luzerne, Bouchemaine, etc
<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufr. subsp. <i>calcitrapae</i>	Boreau		
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	Boreau	Bois secs des terrains calcaires	Fontevrault
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis subsp. <i>litigiosum</i> (Lens) P.D.Sell & Whitehead	Boreau	Lieux sablonneux	Alluvions de la vallée, Vivy, Brion, Beaufort, Saint-Maur, Chaudfonds, etc
<i>Cerintho major</i> L.	FVMA	Levée de la Loire	Montjean
<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	Boreau	Lieux cultivés, fumiers	Dépôts de la voirie de saint-nicolas à Angers
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Millet	Reculée	Angers
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Boreau	Bords des murs, décombres	Angers, Les Ponts-de-Cé, Champtocé, Briollay, Mazé, Beaufort, Longué, Les Rosiers, Saumur, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Doué, Martigné-Briand, Cholet
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Millet		Beaufort ou Beaufort-en-Vallée
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Millet		Ingrandes
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Millet		Les Rosiers
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Millet		Saint-Jean-de-la-Croix
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Millet	Talus de la Levée du Pont Fouchard, etc.	Saumur
<i>Cicuta virosa</i> L.	Boreau		Châteaupane, Candé
<i>Cirsium x hybridum</i> Koch ex DC.	Boreau	Lieux marecageux	Au jarrye à Brain-sur-Allonnes
<i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd.	Préaubert, 1906 à 1908	Ancienne carrière entre le château du Gué et la chametellière	Loiré
<i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl		Misengrain	Noyant-la-Gravoyère
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Millet		Auverse
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Boreau	Champs des terrains calcaires	Baugé, Pontigné, Noyant, Pellouailles, Saint-Sylvain, Champigny-le-sec
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Millet	Fourneux et ses environs	Dampierre
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Millet		Le Guédeniau
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Millet	Lieux cultivés aux environs de la Marsonnière (ferme), calcaire d'eau douce	Noyant
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Millet		Pellouailles
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Millet	Bords et environs du ruisseau de Grézillon, depuis la Maison-Neuve jusqu'à Baugé (calcaire d'eau douce)	Pontigné

<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Millet	Champs cultivés, prairies, pâture et colline du Petit-Trouvé (métairie). Calcaire d'eau douce.	Pontigné
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Millet		Saint-Sylvain
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Millet		Souzay
<i>Coriandrum sativum</i> L.	Boreau		Aux bords des champs à , Les Ponts-de-Cé
<i>Cornus mas</i>	Préaubert, 1906 à 1908	Escarpelements de la falaise de la Loire, de Saumur à Montsoreau, et dans les vallées perpendiculaires	Saumur
<i>Cornus mas</i> L.	Préaubert		Brézé
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch	Boreau	Champs calcaires	Vihiers, Doué, Le Puy-Notre-Dame, Montreuil, Fontevault
<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	Millet	champ de St-Laud	Angers
<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	Boreau	Parasite sur le lin cultivé	Angers, Vallée de rochefort à , La Chapelle-sur-Oudon, Le tremblai
<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	Millet		Combrée
<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	Millet		La Chapelle-sur-Oudon
<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	Millet		La Potherie
<i>Cuscuta suaveolens</i> Ser.			
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Millet	Village des Fourneaux, ses environs et jusqu'à la Chalouère	Angers
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Boreau	Bords des chemins	Angers, Sainte-Gemmes, Chantoceaux, Saint-Sylvain, Seiches, Chaumont, Pontigné, Blou, Dampierre, Le Puy-Notre-Dame, etc
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Millet		Fontaine-Milon
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Millet	Terrains sablonneux	Marcé
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Millet		Saint-Gemmes-sur-Loire
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Millet	Terrains calcaires	Seiches
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Millet	Village de Mathefelon (terrain de tuf)	Seiches
<i>Cyperus flavescens</i>	Corillion, 1969 (SESA vol. 7)	Etang de Saint-Aubin	Pouancé
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Boreau	Murs humides	Bouchemaine, Jardin de la piverdière
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	Boreau	Bois et prés secs des terrains calcaires	Brezé, Champigny-le-sec, Bois de pocé, Brain-sur-Allonnes
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	Millet	Fourneux et ses environs	Dampierre
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	Millet	Bois de Pocé (terre de landes avec sous-sol calcaire)	Distré
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	Millet		Parnay
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	Millet		Souzay
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	Millet	Bois Joubert	Souzay
<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult.			
<i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC.			
<i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC.	Millet	Terrains calcaires	Aubigné ou Aubigné-Briand

<i>Diploaxis viminea</i> (L.) DC.	Boreau	Lieux cultivés, vignes	Champigny-le-sec à Saumur, Saint-florent, Gennes, Saint-remy, Doué, Le Puy-Notre-Dame, Montreuil, Chavagnes, Aubigné, Jarzé
<i>Diploaxis viminea</i> (L.) DC.	Millet		Chavagnes ou Chavagnes-les-Eaux
<i>Diploaxis viminea</i> (L.) DC.	Millet	Vigne située entre le bois de la Naye et celui de la Caforte	Distré
<i>Diploaxis viminea</i> (L.) DC.	Millet		Jarzé
<i>Diploaxis viminea</i> (L.) DC.	Millet		Le Puy-Notre-Dame
<i>Diploaxis viminea</i> (L.) DC.	Millet		Montreuil-Bellay
<i>Diploaxis viminea</i> (L.) DC.	Millet		Saint-Cyr-en-Bourg
<i>Diploaxis viminea</i> (L.) DC.	Millet	Bois-Brard, situé non loin du Thouet	Saint-Hilaire-Saint-Florent
<i>Diploaxis viminea</i> (L.) DC.	Millet		Souzay
<i>Dipsacus pilosus</i>	Préaubert, 1914 à 1917	vallon d'Armanger	Chalonnnes sur Loire
<i>Dipsacus pilosus</i>	Préaubert, 1914 à 1917	vallon de Jeu au dessous du Moulin d'Archeru	Chaufonds
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich.	Boreau	Fossés secs, lieux stériles	Doué, Le Puy-Notre-Dame
<i>Echinaria capitata</i> (L.) Desf.	Boreau	Champs calcaires	Plaine de montreuil-bellay
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L. subsp. <i>sphaerocephalus</i>	Boreau	Lieux incultes	Moulin de la roche à Pontigné
<i>Elatine macropoda</i> Guss.	Boreau	Lieux mouillés en hiver	Angers, Chemin du port-meslet, Neuville, Boires de champocé à
<i>Eleocharis ovata</i>	Préaubert, année ?	Etang de la Forge	Pouancé
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	Millet	Étangs de Chaumont et leurs bords	Chaumont
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	Boreau	Lieux tourbeux	Echemiré, Chaumont, Saint-Remy-la-Varenne, Saint-Georges-sur-Loire, Louroux, Gesté, Yzernay
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	Millet	Les environs de Chaloché	Marcé
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	Millet	Les environs de Chaloché	Marcé
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	Millet	Les environs de Chaloché	Marcé
<i>Epipactis palustris</i>	Préaubert, 1930 à 1931	marais de Prêle	Distré
<i>Equisetum variegatum</i>	Corillion, 1969 (SESA vol. 7)	Talus de chemin de fer, auprès du bras de Saint-Aubin (est des Ponts de Cé)	
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Millet	Étangs de Chaumont et leurs bords	Chaumont
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Millet		Combrée
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Millet	Carrières abandonnées et lieux marécageux	Juigné-sur-Loire
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Boreau	Marais tourbeux	Juigné-sur-Loire, Chaumont, Seiches, Louroux, Gesté

<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Millet	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye	La Breille
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Millet	Landes d'Asnières	Le Louroux-Béconnais
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Millet	Buttes de Rivet : petites carrières abandonnées, près des moulins de champs-fleuris, etc.	Les Ponts-de-Cé
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Millet	Les environs de l'entrée des Landes (nom d'une maison). Suivre le ruisseau qui se dirige vers la métairie du Pineau	Sceaux
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Millet	Prairies plus ou moins marécageuses à droite et à gauche du pont de Beurousse (route d'Angers à St-Jean-des-Marais), et bord des étangs	Beaucouzé
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Millet	Prés tourbeux et marécageux situés au-dessous des étangs de Chaumont	Chaumont
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Millet	Prés marécageux ou tourbeux au nord de Denezé	Denezé ou Denezé-sous-le-Lude
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Millet	Etang de la Bouquetière et ses bords (terrain tourbeux)	Echemiré ou Echemiré-Rigné
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Millet	Pré tourbeux de la Bouillant	La Chapelle-Hullin
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Millet	Prairies tourbeuses de la métairie des Trois-Cheminées	Mouliherne
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Millet	Bords du Couasnon : prés tourbeux, près le moulin de Choisellier	Pontigné
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Millet	Les environs de l'entrée des Landes (nom d'une maison). Suivre le ruisseau qui se dirige vers la métairie du Pineau	Sceaux
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Millet	Etang ou marais de Villiers. Marais tourbeux, calcaire, séparé en deux parties par la route de Champigné	Thorigné
<i>Eriophorum vaginatum</i>	Préaubert, 1924 à 1925	lande de Boudré	seiches
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Boreau	Lieux tourbeux	Seiches, Landes du boudré
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E.Schulz	Boreau	Lieux sablonneux	Les Ponts-de-Cé, Vallée de Juigné-sur-loire à
<i>Euphorbia brittingeri</i>	Préaubert, 1906 à 1908	prairie du Thouet à Lenay et au NNW, sur la limite de la commune, dans un petit chemin, près de Champ-de-Liveau	Montreuil-Bellay
<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd.			
<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne	Boreau	Prés humides	Pruniers, Beaucouzé
<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	Boreau		Ecoufflant, Briollay, etc

<i>Filago lutescens</i> Jord. subsp. <i>lutescens</i>	Boreau	Champs	Seiches, Brain-sur-l'Authion, Jarzé, Chaumont, La Chapelle-Saint-Laud, Saint-Georges-sur-Loire, Beaupreau, Vernantes
<i>Fragaria viridis</i> Weston subsp. <i>viridis</i>	Boreau	Côteaux calcaires	Montreuil-Bellay
<i>Fragaria viridis</i> Weston subsp. <i>viridis</i>	Millet	Sur la hauteur au-dessus des carrières des Garennes	Vaudelnay-Rillé
<i>Gagea arvensis</i>	Préaubert, 1906 à 1908	chemin de Coulon, tout près de ce dernier village (abondant)	Antoigné
<i>Gagea bohemica</i>	Préaubert, année ?	milliers sur les rochers escarpés près du cimetière, un peu en aval sur la roche de Mantelon	Denée
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.	Boreau	Lieux sablonneux	Iles de la Loire, Villebernier, Champs de Beauvoyer
<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Millet	Bords des champs, lieux frais	Briollay
<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Millet	Bords des champs, lieux frais	Tiercé
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Millet	Terrains calcaires	Aubigné ou Aubigné-Briand
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Millet	Terrain calcaire	Charcé
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Millet	Terres calcaires	Faveraye
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Millet		Le Plessis-Grammoire
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Millet	Terrain calcaire	Les Alleuds ou Saint-Aubin-des-Alleuds
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Millet		Lué
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Millet		Vern
<i>Galium glaucum</i> L.			
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Boreau	Bois couverts	Fontevrault, Marcé, Le baugeois, Pouancé, Pontron
<i>Galium pumilum</i> Murray subsp. <i>pumilum</i> var. <i>pubescens</i> (Schrad.) Schinz & Thell.	Boreau		Baugé
<i>Galium spurium</i> L.	Boreau	Champs	Saumur, Brion, Chalonnes
<i>Galium spurium</i> L. subsp. <i>spurium</i> var. <i>echinospermum</i> (Wallr.) N.H.F.Desp.	Boreau	Champs	
<i>Galium tricornerutum</i> Dandy	Millet		Cisay ou Cizay-la-Madeleine
<i>Galium tricornerutum</i> Dandy	Millet	Champs cultivés	Distré
<i>Galium tricornerutum</i> Dandy	Millet	Les environs de Chaloché	Marcé
<i>Galium tricornerutum</i> Dandy	Millet	Lieux cultivés aux environs de la Marsonnière (ferme), calcaire d'eau douce	Noyant
<i>Galium tricornerutum</i> Dandy	Millet	Localités diverses	Pontigné
<i>Galium tricornerutum</i> Dandy	Millet	Terre calcaire	Soulangé ou Soulangier
<i>Genista pilosa</i>	Préaubert, 1902	vallée en patte d'oie, au sud du bourg, dans la lande (abondant)	Courléon
<i>Genista pilosa</i>	Préaubert, 1902	vallée en patte d'oie, au sud du bourg, dans la lande (abondant)	Courléon

Genista pilosa	Préaubert, 1902	rive gauche du thalweg des étangs supérieurs, à la traversée de la route de Vernoi à la Breille (abondant)	
Genista pilosa L.	Millet	Buttes ou landes de Blou ainsi que de Neuillé	Blou
Genista pilosa L.	Millet	Butte de Mouron ou Montrond	Chartrené
Genista pilosa L.	Millet	à l'est de la forêt, route de Fontevrault, etc.	Fontevrault
Genista pilosa L.	Boreau	Côteaux, bois secs, landes	Landes de seiches à , Fontaine-Milon, Chartrenai, Clefs, Neuillé, Allonnes, La Breille, Champigny-le-sec, Cholet
Genista pilosa L.	Millet	Buttes des Provençères (terrain arénacé-crayeux)	Les Ulmes
Genista pilosa L.	Millet		Souzay
Genista pilosa L.	Millet	Parc ou bois de Verrie	Verrie
Genista purgans L.	Boreau	Rochers	Schistes à Juigné-sur-loire à Juigné-sur-Loire
Genista sagittalis L.	Boreau	Côteaux calcaires	Champigny-le-sec, Montreuil-Bellay, Pontigné
Genista sagittalis L.	Millet	Fourneux et ses environs	Dampierre
Genista sagittalis L.	Millet	Forêt de Fontevrault	Fontevrault
Genista sagittalis L.	Millet	Bois de Pierre-Couverte	Pontigné
Genista sagittalis L.	Millet		Souzay
Gentiana pneumonanthe	Corillion, 1983 (SESA n°56)	(B. Lambert, 1982)	Chaloché (près Seiches)
Gentiana pneumonanthe	Corillion, 1983 (SESA n°56)	landes	Chaumont-d'Anjou
Gentiana pneumonanthe	Corillion, 1983 (SESA n°56)	(B. Lambert, 1982)	La Touchardière près de Durtal
Gentiana pneumonanthe	Corillion, 1983 (SESA n°56)	(B. Lambert, 1982)	Les Coquetières (E. de la Lande-Chasles)
Gentiana pneumonanthe	Préaubert, 1924 à 1925	pâtures de la Pichardière	Lézigné
Gentiana pneumonanthe	Corillion, 1983 (SESA n°56)	les Bardinières (NE de Turbilly) (B. Lambert, 1982)	Vaulandry
Gentianella germanica	Boreau, 1859	Bois de Pierre-Couverte	Pontigné
Gentianella germanica (Willd.) Börner	Boreau	Collines calcaires	Pontigné, Bois de pierre-couverte
Gladiolus geupini	Préaubert, 1906 à 1908	à 500 m environ au dessus de l'étang du Grand Tertre, sur la pente formant le côté droit du thalweg, dans les cultures dépendant de la ferme de la Bourrée, abondant	Beaucouzé
Gladiolus illyricus	Préaubert, 1930 à 1931	landes dans le voisinage de l'étang de La Bruyère	Chaumont-d'Anjou
Globularia vulgaris	Préaubert, 1906 à 1908	anciens fours à chaux de l'Orchère	Chaudefonds
Groenlandia densa (L.) Fourr.	Millet	Le Loir, le long des prairies, à partir du pont jusqu'au	Soucelles

		ruisseau de la Filière	
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman	Boreau	Vieux murs	Dans le bourg à Fontevrault
<i>Halimium alyssoides</i> (Lam.) K.Koch	Boreau	Bois et bruyères	Forêt de chambiers à
<i>Herniaria cinerea</i> DC.	Préaubert	bourg	Chaufefonds
<i>Hesperis matronalis</i>	Préaubert, 1906 à 1908	bords du ruisseau de la Conterie, entre les 2 métairies de l'Aubance et du Bas-Pré	Chaufefonds
<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat	Boreau		Angers, Morannes
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	Boreau	Bois des terrains calcaires	Baugé, Forêt de chandelais à
<i>Hordeum hystrix</i> Roth	p, FVMA	Fourneux et ses environs	Chalonnnes et Liré
<i>Hordeum marinum</i> Huds.	Préaubert		Chaufefonds, St-Lambert du Lattay, Chalonnnes, Faye
<i>Hordeum x pavisii</i> Préaub.	Préaubert		Chalonnnes, Doué, Les Ponts de Cé
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	Boreau	Lieux secs et pierreux	Plateau de champigny-le-sec à
<i>Hypocoum pendulum</i> L.	Millet		Chacé
<i>Hypocoum pendulum</i> L.	Millet		Les Verchers
<i>Hypocoum pendulum</i> L.	Boreau	Champs calcaires	Varrains, Saint-cyr, Montreuil, Les Ulmes, Meigné, Forges, Distré, Le Puy-Notre-Dame
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millet	Forêt de Beaulieu	Beaulieu
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millet	Bois de Bournée, contigu à la forêt de Fontevrault	Brezé
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millet		Champtoceaux
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millet	Forêt de Fontevrault	Fontevrault
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millet	Les environs de Chaloché	Marcé
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millet		Montjean
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millet	Les bois - le sol qui est sablonneux, repose sur le calcaire	Soucelles
<i>Hypericum montanum</i> L.	Boreau	Bois montueux surtout calcaires	Soucelles, Marcé, Brezé, Forêt de fontevrault à , Montjean, Chantoceaux
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millet		Thouarcé
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Millet	Bois du Tertre	Brezé
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Millet	Forêt de Brossay	Brossay
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Millet		Chaumont
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Millet	Forêt de Fontevrault	Fontevrault
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Boreau	Landes et bois	Forêt de brignon à , Forêt de fontevrault à , Brezé, Verrie, Saint-florent-lès-saumur, Yzernay, Chaumont, Auverse
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Millet	Bois de Marsoleau, de 77 hectares	Saint-Hilaire-Saint-Florent
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Millet	Bois-Brard, situé non loin du Thouet	Saint-Hilaire-Saint-Florent
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Millet		Souzay
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Millet	Parc ou bois de Verrie	Verrie
<i>Hyssopus officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Boreau		Sur les murs de clôture à Rochemenier

<i>Impatiens noli-tangere</i>	Préaubert, 1930	ruisseau de Jarry, près des Ruaux, au lieu-dit "les Grands-Cours" (ruisseau forme un marécage très ombragé avec <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Thelypteris palustris</i>)	Brain-sur-Allonnes
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Boreau	Lieux frais et couverts	Brain-sur-Allonnes, Ruisseau de jarrye, Près la route de bourgueil à , Saint-Sauveur-de-Landemont, Bords de la divatte
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Millet	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye	La Breille
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Millet		La Varenne
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	fvma	bords ombragés de la Maine	Angers
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Boreau	Lieux secs	Saumur, Rochers du coteau de la loire
<i>Jasminum fruticans</i> L.	Boreau		Montsoreau, Aux arènes à Doué, etc
<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>kochii</i> (F.W.Schultz) Reichg.	Boreau		Angers, Chaloché, etc
<i>Juncus gerardi</i> Loisel. subsp. <i>gerardi</i>	Boreau	Lieux humides	Chalonnnes
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss			
<i>Lathraea squamaria</i>	Préaubert, 1911 à 1913	entre Nantilly et le cimetière, chemin de la Fuie et des Violettes, au bas du coteau, de la vallée du Thouet (sur racines de Noyer)	Saumur
<i>Lathraea squamaria</i>	Préaubert, 1930	La Vignole, au pied du coteau	Turquant
<i>Lathraea squamaria</i>	Préaubert, 1930	La Vignole, au pied du coteau	Turquant
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>linifolius</i>	Boreau		Petite forêt de baugé à
<i>Lathyrus pannonicus</i>	Préaubert, 1914 à 1917	dans les prairies dépendant du Ruisseau des Landes d'Asnières, notamment à la traversée de la route d'Angers et de la voie ferrée aux stations de St-Augustin des bois et Bécon, et en remontant jusque vers le Louroux béconnais	Bécon
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i> var. <i>glabratus</i> (W.D.J.Koch) Bisch.	Boreau		
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Millet		Jarzé
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Millet	près le village de la Gâtelière	Noyant-la-Gravoyère
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Millet		Pouancé
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Millet	près la métairie de l'Erable	Saint-Lambert-des-Levées
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Millet	Talus de la Levée du Pont Fouchard, etc.	Saumur
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Millet	Bords de la Loire, les Huraudières, etc.	Saumur

Leonurus cardiaca L.	Boreau	Haies	Saumur, Saint-lambert, Vivy, Brain-sur-Allonnes, Jarzé, Baugé, Brissarthe, Soucelles, La roche-fouque, Avrillé, Trélazé, Chazé-henri, Noellet, Pouancé
Leonurus cardiaca L.	Millet	Les environs de l'entrée des Landes (nom d'une maison). Suivre le ruisseau qui se dirige vers la métairie du Pineau, près la maison du Pineau	Sceaux
Leonurus cardiaca L.	Millet	Lieux incultes	Soucelles
Leonurus cardiaca L.	Millet		Trélazé
Lepidium latifolium L.	Boreau	Lieux humides	Bord du jeu à chalonnes à Chalonnes, La haie-longue, Bord du couasnon à baugé à Baugé, Saint-Macaire, La Plaine, Saint-georges-des-Sept-Voies, Saint-rémy-la-varenne, Saumur, Les Rosiers, Seiches, Saint-Barthélemy, Murs, Chavagnes, Martigné
Lepidium latifolium L.	Millet	marais de Corzé	Corzé
Lepidium latifolium L.	Millet		Jarzé
Lepidium latifolium L.	Millet		Les Rosiers
Lepidium latifolium L.	Millet		Martigné-Briand
Lepidium latifolium L.	Millet	Bords du Couasnon : prés tourbeux, près le moulin de Choisellier	Pontigné
Lepidium latifolium L.	Millet		Saint-Barthélémy
Lepidium latifolium L.	Millet	bord du ruisseau de la mécanique, près le Pont-Herbault	Seiches
Lepidium latifolium L.	Millet	entre Soulangier et Saint-Georges-Châtelais	Soulangé ou Soulangier
Lepidium latifolium L.	Millet	Les environs du château de Riou (terrain calcaire)	Tigné
Lepidium sativum L.	Boreau	Bords des haies et champs	Angers
Lindernia dubia (L.) Pennell subsp. dubia	Corillion	Vallée de la Loire	
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox	Boreau	Bords des eaux	Alluvions de la Loire, Bords de l'oudon, Bords de la mayenne, Juigné, Angers, Bouchemaine
Linum strictum L.	Millet		La Prévière
Linum strictum L.	Boreau	Côteaux calcaires	Le Puy-Notre-Dame, Montreuil-bellai
Liparis loeselii	Préaubert, 1902	marais au dessus des étangs	Chaumont-d'Anjou
Liparis loeselii	Soc. Linn. Maine-et-Loire, 22 juin 1854	Tourbière de Rochebouet à environ 3 km à l'est (l'ouest ?) du bourg de Chaumont (avec Parnassia palustris, Pinguicula lusitanica, Eriophorum gracile)	Chaumont-d'Anjou
Liparis loeselii	L'abbé F. Hy, 1887	près de Chaloché	Chaumont-d'Anjou

<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Boreau	Marais tourbeux	Marais au-dessous des étangs à Chaumont,
<i>Lithospermum arvense</i> L. var. <i>permixtum</i> Jord.	Boreau	Champs	Angers, Beaucouzé, Gennes
<i>Lolium remotum</i> Schrank	Boreau	Champs de lin	Les Ponts-de-Cé, Beaulieu, Combrée, Noellet, Le Tremblay, Bouillé-Ménard
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin subsp. <i>rigidum</i>	Boreau	Champs, vignes	Sainte-Gemmes, Bouchemaine, Villevêque, Chaumont, Gonnord, Thouarcé, Saumur, etc
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin subsp. <i>rigidum</i>	Millet	près le moulin de Moque-Souris	Savennières
<i>Lolium temulentum</i> L.	Millet		Lué
<i>Lolium temulentum</i> L.	Millet	lieux cultivés, au sud de la métairie de la Bichetière	Vern
<i>Lolium temulentum</i> L. var. <i>arvense</i> Liljebl.	Boreau	Champs	Angers, Châteauneuf
<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	Préaubert	bois de Bon-Repos	Feneu
<i>Lycium barbarum</i> L.	Boreau		Saumur, La levée à , etc,
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Boreau	Lieux tourbeux	Soucelles, Colline d'où l'on extrait le grès, Landes de courléon
<i>Lycopodium clavatum</i>	Préaubert, 1924 à 1925	Existence devenue problématique par suite du défrichement progressif de la forêt d'Ombrée	Combrée
<i>Lycopodium clavatum</i>	Boreau, 1859	Forêt de Combrée (bois, châtaigneraies)	Combrée
<i>Lycopodium clavatum</i>	Boreau, 1859	(bois, châtaigneraies)	Montreuil-Belfroi
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Boreau	Bois, châtaigneraies	Montreuil-belfroi, Forêt d'ombrée
<i>Lycopodium inundatum</i>	Préaubert, 1902	dans le thalweg des étangs supérieurs, en bordure du bassin de M. Pelletier, rive droite (Lg. O. 2G 52' 70" ; Lt. 52G 61' 40")	la Breille
<i>Lysimachia nemorum</i> L.	Millet	lieux frais et ombragés, près le ruisseau du Bois-Bernier	Noellet
<i>Lysimachia nemorum</i> L.	Millet	Étang de la Corbinière, ses bords, etc.	Noyant-la-Gravoyère
<i>Lysimachia nemorum</i> L.	Millet		Nyoseau
<i>Lysimachia nemorum</i> L.	Millet		Pouancé
<i>Lysimachia nemorum</i> L.	Boreau	Lieux tourbeux ou mouillés	Pouancé, Noellet
<i>Malva nicaeensis</i> All.	Millet		Angers
<i>Malva nicaeensis</i> All.	Boreau	Lieux secs, bords des chemins	Angers, Briollay, Suette, Champigny-le-sec, Montreuil-bellai, Tigné, Martigné, Montilliers, Beaulieu, Chaudfonds, Chalonnes, Châteaupane, Saint-georges, La Possonière, Beaucouzé, Sainte-Gemmes, Saint-Jean-de-la-Croix, etc

Malva nicaeensis All.	Millet		Beaulieu
Malva nicaeensis All.	Millet	Terres calcaires	Faveraye
Malva nicaeensis All.	Millet	Métairie de la Rémousinière	La Séguinière
Malva nicaeensis All.	Millet		Martigné-Briand
Malva nicaeensis All.	Millet	La guerouas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain calcaire)	Martigné-Briand
Malva nicaeensis All.	Millet		Montilliers
Malva nicaeensis All.	Millet		Montreuil-Bellay
Malva nicaeensis All.	Millet		Nueil-sous-Passavant
Malva nicaeensis All.	Millet		Passavant
Malva nicaeensis All.	Millet		Saint-Gemmes-sur-Loire
Malva nicaeensis All.	Millet		Saint-Georges-sur-Loire
Malva nicaeensis All.	Millet	Terrain calcaire	Tigné
Malva x intermedia Boreau	Boreau	Haies et bois	Brain-sur-Allonnes, Cheffes
Marsilea quadrifolia	Préaubert, 1930	boire dite de Chauvelon, en amont de La Patache, abondant (Pichon)	Champtoceaux
Melampyrum cristatum	Préaubert, 1906 à 1908	Doua	Rablay-sur-Layon
Melilotus indicus (L.) All.	Corillion	bord de Maine	Angers
Mentha x carinthiaca Host	Boreau	Lieux humides	Montreuil-Bellay
Mentha x gentilis L.	Boreau		Angers, Marcé
Milium scabrum	Préaubert, 1926 à 1927	ferme de "le Plongeon", long. W. 2G 58' 90" ; lat. 52G 50' 85"	Varennes-sur-Loire (bord ouest)
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz & Thell.	Boreau	Lieux sablonneux	Bords de la Loire, Marcé
Myagrum perfoliatum L.	Millet		Cisay ou Cizay-la-Madeleine
Myagrum perfoliatum L.	Millet		Cisay ou Cizay-la-Madeleine
Myagrum perfoliatum L.	Millet	Fourneux et ses environs	Dampierre
Myagrum perfoliatum L.	Millet		Denezé ou Denezé-sous-le-Lude
Myagrum perfoliatum L.	Millet	Champs cultivés	Distré
Myagrum perfoliatum L.	Millet	Terrain calcaire	Doué ou Doué-la-Fontaine
Myagrum perfoliatum L.	Millet	Champs cultivés	Les Ulmes
Myagrum perfoliatum L.	Millet	Lieux cultivés aux environs de la Marsonnière (ferme), calcaire d'eau douce	Noyant
Myagrum perfoliatum L.	Boreau	Champs argileux	Noyant-baugé, Pontigné, Saumur, Champigny-le-sec, Distré, Le Puy-Notre-Dame, Doué, Vallées de la Loire
Myagrum perfoliatum L.	Millet	Bords et environs du ruisseau de Grézillon, depuis la Maison-Neuve jusqu'à Baugé (calcaire d'eau douce)	Pontigné
Myagrum perfoliatum L.	Millet	Champs cultivés, prairies, pâture et colline du Petit-Trouvé (métairie). Calcaire d'eau douce.	Pontigné
Myagrum perfoliatum L.	Millet	Localités diverses	Pontigné

<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Millet		Souzay
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Millet		Bauné
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Millet	Les environs de Chaloché	Marcé
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Millet	Les environs de Chaloché	Marcé
<i>Myosotis sicula</i> Guss.	Millet		Angers
<i>Myosotis sicula</i> Guss.	Boreau	Bords des mares sur les schistes	Angers, Saint-Augustin, Saint-léonard à , La baumette, Juigné-sur-Loire, etc
<i>Myosotis sicula</i> Guss.	Millet	Prairies plus ou moins marécageuses à droite et à gauche du pont de Beurousse (roite d'Angers à St-Jean-des-Marais), et bord des étangs	Beaucouzé
<i>Myosotis sicula</i> Guss.	Millet		Saint-Barthélémy
<i>Narcissus poeticus</i> L. subsp. <i>poeticus</i>	Millet	dans un champ de la Beuchardière	Champigné
<i>Narcissus poeticus</i> L. subsp. <i>poeticus</i>	Boreau	Prairies	Combrée, Champigné, Pré de la buchardière
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>major</i> (Curtis) Baker	Boreau		
<i>Narcissus x incomparabilis</i> Mill.	Boreau	Prés, bois	Etriché, Bois du plessis-chivré
<i>Narcissus x medioluteus</i> Mill.	Boreau	Prairies	Bouchemaine, Savennières, Thorigné, Combrée, La corbinière, Seiches
<i>Narcissus x odorus</i> L.	Boreau		
<i>Narthecium ossifragum</i>	Préaubert, 1924 à 1925	tourbière de Bataille	Noellet
<i>Narthecium ossifragum</i>	Corillion, 1983 (SESA n°56)	tourbière de Bataille (doute sur la survivance prochaine de la station)	Noellet
<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds.	Millet	Lande du Mollet ; lande tourbeuse dépendant des fermes de la Julinière et de la Rainebaudais	Angrie
<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds.	Boreau	Lieux tourbeux	Angrie, Landes du mollet, Saint-michel, Noellet
<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds.	Millet		Nyoseau
<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb.	Boreau	Lieux tourbeux	Beaucouzé
<i>Neottia</i>	Préaubert, 1924 à 1925	bois du Grip	Durtal
<i>Neottia</i>	Préaubert, 1919 à 1921	coteau de Moque-Souris	Rablay-sur-Layon
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Millet	Terrains calcaires	Ambillou
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Millet		Denezé ou Denezé-sous-le-Lude
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Millet	Champs cultivés	Distré
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Millet	Village de Pocé	Distré
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Millet	Terrain calcaire	Doué ou Doué-la-Fontaine
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Millet	Champs cultivés	Les Ulmes
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Millet	La guerouas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain	Martigné-Briand

		calcaire)	
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Millet	Plantes du Toureil	Saint-Georges-le-Toureil
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Boreau	Champs des terrains calcaires	Saumur, Champigny-le-sec, Saint-florent, Distré, Doué, Louresse, Ambillou, Saint-rémy, etc
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Millet		Souzay
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Millet	Terrain calcaire	Tigné
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Millet		Vernantes
<i>Nicandra physaloides</i> (L.) Gaertn.	Boreau		
<i>Oenanthe fluviatilis</i>	herbier BOUVET (plante cueillie pendant l'été 1894)	La plante fut cueillie dans le Loir	Villevêque
<i>Oenothera syrticola</i> Bartlett		Alluvions de la loire	Gennes, Les Ponts-de-Cé, Denée, Saint-Germain-des-Prés
<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz	Millet	champs incultes	Beaucouzé
<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz	Millet	les champs de genêts ou friches	Bécon
<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz	Boreau	Bois montueux	Pruniers, Saint-Léger-des-Bois, Neuville, Le lion, Combrée, Pouancé, Roussai, La Romagne
<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz	Millet	lieux incultes, bois, champs de genêts	Saint-Clément-de-la-Place
<i>Ononis pusilla</i> L.	Millet	Terrains calcaires	Aubigné ou Aubigné-Briand
<i>Ononis pusilla</i> L.	Millet	Champs sablonneux entre Brezé et Montreuil	Brezé
<i>Ononis pusilla</i> L.	Millet	Terrain calcaire	Doué ou Doué-la-Fontaine
<i>Ononis pusilla</i> L.	Millet	La guerouas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain calcaire)	Martigné-Briand
<i>Ononis pusilla</i> L.	Boreau	Pelouses arides des terrains calcaires	Martigné-Briand, Doué, Le Puy-Notre-Dame, Brezé, Champigny-le-sec
<i>Ononis pusilla</i> L.	Millet		Souzay
<i>Ophrys fusca</i>	Préaubert, 1924 à 1925	à la butte des Rairies	Montigné les Rairies
<i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch.	Boreau	Friches calcaires	Echemiré
<i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch.	Millet	Les environs de la Grifferaye (terrain calcaire)	Echemiré ou Echemiré-Rigné
<i>Orchis coriophora</i> L. subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) Sudre	sesa JLR	Etang de Belleville	Turbilly
<i>Orchis coriophora</i> subsp. <i>fragrans</i>	Préaubert, année ?	Etang de BelleVille	Vaulandry
<i>Orchis militaris</i> L.	Piron		Saint-Cyr-en-Bourg
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Millet	Marais de Presles	Distré
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Boreau	Prés tourbeux	Distré, Saint-Remy-la-

			Varenne
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Millet	Les environs de Chaloché	Marcé
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Millet		Saint-Rémy-la-Varenne
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Millet	L'étang Penay et ses bords, semi-tourbeux	Tiercé
<i>Oreopteris limbosperma</i>	Boreau, 1859	Vallée de la Moine (lieux couvertes et montagneux)	Montigné-sur-Moine (=Montfaucon-Montigné)
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Millet	Coteaux de Servières (coteaux plantés en vignes)	Beaulieu
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Millet	Terrain calcaire	Charcé
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Millet		Chaumont
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Millet		Lasse
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Millet	Terrain calcaire	Les Alleuds ou Saint-Aubin-des-Alleuds
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Millet	Lieux cultivés aux environs de la Marsonnière (ferme), calcaire d'eau douce	Noyant
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Millet	Bords et environs du ruisseau de Grézillon, depuis la Maison-Neuve jusqu'à Baugé (calcaire d'eau douce)	Pontigné
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Millet	Champs cultivés, prairies, pâture et colline du Petit-Trouvé (métairie). Calcaire d'eau douce.	Pontigné
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Boreau	Moissons des terrains calcaires	Saumur, Le Puy-Notre-Dame, Beaulieu, Chaumont, Marcé, Pontigné
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Millet	Colline boisée à partir du village de la Dionnière	Villevêque
<i>Ornithopus sativus</i> Brot. subsp. <i>sativus</i>	Boreau	Champs sablonneux	Marson, Cléré
<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd.	Boreau	Sur le thymus serpyllum	Baugé, Marcé, Champigny-le-sec
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Boreau	Sur le teucrium chamaedrys	Baugé, Chaloché, Aux noyers à Martigné
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Millet	Les environs de Chaloché	Marcé
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Millet	Bords et environs du ruisseau de Grézillon, depuis la Maison-Neuve jusqu'à Baugé (calcaire d'eau douce)	Pontigné
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Millet	Localités diverses	Pontigné
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>lecoqii</i> (Lamotte) Syme	Boreau	Champs, murs, vignes	
<i>Paris quadrifolia</i>	Préaubert, 1930 à 1931	bois de Bareil, sur le bord de La Marconne	Chigné
<i>Parnassia palustris</i>	Préaubert, 1924 à 1925	marécages du Grip	Durtal
<i>Pedicularis palustris</i>	Préaubert, 1930 à 1931	ruisseau marécageux descendant de La Brunellière sur Vaux	Montreuil-sur-Loir
<i>Peucedanum carvifolia</i> Vill.	Boreau	Prés humides	Vallée de la sarthe, Cheffes, Briollay, Angers, Prairies de la Loire, Sainte-Gemmes,

			Chalonnnes, Beaulieu, etc
<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.	Boreau	Bois des terrains calcaires	Forêt de fontevrault à
<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Boreau	Marais	Saint-Sigismond
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Boreau	Vignes	Saumur, Doué, Milly, Saulgé-l'Hopital, Aubigné, Tigné, Maligné à , Soucelles, La roche-fouque, Corzé, Brissarthe, Lasse, etc
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Boreau	Pelouses sèches, côteaux calcaires	Courchamps
<i>Pilularia</i>	Préaubert, 1924 à 1925	étang de la Bersillière, au nord du Grip	Durtal
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Préaubert, 1902	vallon des Trois-Cheminées	Mouliherne
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Préaubert, 1902	vallée du Couesnon	Pontigné
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Préaubert, année ?	Etang de Turbilly, vallée tourbeuse	Turbilly (Vaulandry)
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Millet	Lande du Mollet ; lande tourbeuse dépendant des fermes de la Julinière et de la Rainebaudais	Angrie
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Boreau	Lieux tourbeux	Brain-sur-Allonnes, La Breille, Chaumont, Angrie, Noyant
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Millet	Prés tourbeux et marécageux situés au-dessous des étangs de Chaumont	Chaumont
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Millet	Prés marécageux ou tourbeux au nord de Denezé	Denezé ou Denezé-sous-le-Lude
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Millet	Le Perray et ses environs	Ecouffant
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Millet	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye	La Breille
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Millet	Terrain calcaire	Sermaise
<i>Polycnemum arvense</i> L.	Boreau	Lieux sablonneux	Bords de la Loire, Sainte-Gemmes
<i>Polycnemum majus</i> A.Braun	Boreau	Champs pierreux	Saint-augustin à Angers, Trélazé, Ecouffant, Soucelles, Villevéque, Bauné, Longué, Blaison, Juigné, Louresse, La grézille, Martigné, Les Ulmes, Marson, Montreuil-Bellay
<i>Polygala amarella</i> Crantz	Millet	Marais de Presles	Distré
<i>Polygala amarella</i> Crantz	Millet	Près l'embouchure de l'Oudon	Grez-Neuville
<i>Polygala amarella</i> Crantz	Boreau	Pelouses humides	Les Ulmes
<i>Polygala amarella</i> Crantz	Millet	Buttes des Provençères (terrain arénacé-crayeux)	Les Ulmes
<i>Polygala amarella</i> Crantz	Millet	Landes de Sceaux. Landes cultivées	Sceaux
<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	Boreau	Lieux secs	Champigny-le-sec, Forêt de fontevrault à , Brezé
<i>Polygonum bellardii</i> All.	Millet	Lieux cultivés aux environs de la Marsonnière (ferme), calcaire d'eau douce	Noyant

<i>Polygonum bellardii</i> All.	Millet	Bords et environs du ruisseau de Grézillon, depuis la Maison-Neuve jusqu'à Baugé (calcaire d'eau douce)	Pontigné
<i>Polygonum bellardii</i> All.	Millet	Champs cultivés, prairies, pâture et colline du Petit-Trouvé (métairie). Calcaire d'eau douce.	Pontigné
<i>Polygonum bellardii</i> All.	Boreau	Champs calcaires	Pontigné, Corné
<i>Polygonum bistorta</i>	Corillion, 1983 (SESA n°56)	(B. Lambert, 1982)	SAINT-MARTIN-D'ARCE
<i>Polygonum bistorta</i>	Corillion, 1983 (SESA n°56)	tourbière du Moulin du Fay près Turbilly (B. Lambert, 1982)	Turbilly (Vaulandry)
<i>Polygonum bistorta</i> L.	Corillion		Turbilly, St Martin d'Arcé
<i>Polygonum orientale</i> L.	Boreau	A été recueilli plusieurs fois comme spontané aux bords de la Loire.	
<i>Polystichum aculeatum</i>	Préaubert, 1914 à 1917	route de Pin en Mauges, près de l'Homme, talus de la route	Beaupréau
<i>Polystichum lonchitis</i>	Préaubert, année ?	Descendant de la butte des Gardes, le point le plus élevé du département, pour me rendre à la Tourlandry, 1 pied dans un puits sur le bord du chemin	Saint-Georges-des-Gardes ; Tourlandry
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	Millet	Reculée (fossé)	Angers
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	Boreau	Fossés, ruisseaux	Fontevault, Le thouet à Montreuil à Montreuil, Angers, Fossés de la vallée de la maine
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Corillion	est du département	
<i>Potamogeton obtusifolius</i>	Préaubert, année ?	Etang de Péronne	Chanteloup
<i>Potamogeton obtusifolius</i>	Préaubert, année ?	Etang de la Thibaudière	La Plaine
<i>Potamogeton obtusifolius</i>	Préaubert, année ?	Etang de la Fendrie	Pouancé
<i>Potamogeton trichoides</i>	Préaubert, année ?	Etang de Maumusson	Saint-Michel-et-Chanveaux
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller subsp. <i>grandiflora</i>	Millet	Terrain calcaire	Brion
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller subsp. <i>grandiflora</i>	Boreau	Pelouses calcaires	Cléré, Saint-pierre-des-champs
<i>Puccinellia rupestris</i> (With.) Fernald & Weath.	Corillion		Angers
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.	Boreau	Bois	Côteaux de la Loire, Saumur, Saint-Maur, Chalonnes, Seiches
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.	Millet	lieux ombragés, les bois	Le Puy-Notre-Dame
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.	Millet	bois, etc.	Lué
<i>Pulmonaria x ovalis</i> Bastard	Boreau	Bois	Beaupréau, Cholet, Saint-Maur, Le thoueil, Saint-Augustin-des-Bois
<i>Pulmonaria x ovalis</i> Bastard	Millet	les bois	Chenehutte-les-Tuffeaux
<i>Pulmonaria x ovalis</i> Bastard	Millet	lieux couverts	La Jubaudière
<i>Pulmonaria x ovalis</i> Bastard	Millet	lieux ombragés	Le May

<i>Pulmonaria x ovalis</i> Bastard	Millet	Petit bois situé au nord de la maison du verger	Saint-Pierre-Montlimard
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Préaubert, 1906 à 1908	Forêt de Brossay, aux quatre-Chênes	Brossay
<i>Pulsatilla vulgaris/rubra</i>	Préaubert, 1906 à 1908	dans les garennes du Vaudelenay, tout près de Montreuil-Bellay	Vaudelnay
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>ficariiformis</i> Rouy & Foucaud			
<i>Ranunculus lingua</i>	Préaubert, 1930 à 1931	étang de Selaine	Etriché
<i>Ranunculus lingua</i>	Préaubert, 1906 à 1908	Etang de Villeneuve	St-Martin de la Place
<i>Ranunculus lingua</i>	Préaubert, 1902	vallée du Loir, des 2 côtés de la levée de Briollay à la Dionnière	
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	Millet	Carrières abandonnées et lieux marécageux	Juigné-sur-Loire
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	Millet	Buttes de Rivet : petites carrières abandonnées, près des moulins de champs-fleuris, etc.	Les Ponts-de-Cé
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	Boreau	Bords des mares sur les schistes	Sorges, Moulin de Rivet, Sainte-Gemmes, Juigné-sur-Loire, Montreuil-sur-Loir, Thorigné
<i>Ranunculus ololeucos</i>	Préaubert, année ?	Etang de Brestaud	Entre Clefs et Turbilly (Vaulandry)
<i>Ranunculus ololeucos</i>	Préaubert, 1902	Forêt de Chambier, étang de la Simonette	
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>drouetii</i> (F.W.Schultz ex Godr.) P.Fourn.	Boreau	Eaux paisibles	Angers, Villevêque, Combrée, etc
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>drouetii</i> (F.W.Schultz ex Godr.) P.Fourn.	Millet		Jarzé
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>drouetii</i> (F.W.Schultz ex Godr.) P.Fourn.	Millet	Terrain calcaire	Sermaise
<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai			
<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel. subsp. <i>grandiflorus</i> (Wallr.) D.A.Webb			
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Boreau	Marais et prés tourbeux	Brain, Courléon, La Breille, Chaumont, Landes de seiches, Forêt de chambiers, Louroux, Angrie, Saint-michel, Noellet, Pouancé, Villemoisan
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Millet	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye	La Breille
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	Millet	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau	La Breille

		de Jarrye	
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	Boreau	Marais	La Breille, Pontigné, Étang de chambiers, Chaumont
<i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC.	Boreau	Moissons des terrains calcaires	Montreuil-Bellay, Vaudelnay, Le Puy-Notre-Dame
<i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC.	Millet	champs cultivés, sablonneux, sur la route du Puy-Notre-Dame	Vaudelnay-Rillé
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.			
<i>Rosa pimpinellifolia</i> L. forme. typica Rouy	Boreau	Lieux secs, sablonneux	Sud forêt de vezins à , Izernay, Cléré
<i>Rosa sempervirens</i> L.	Millet	à l'est	Angers
<i>Rosa sempervirens</i> L.	Boreau	Haies	Angers, Saint-Barthélemy, Chalonnnes, Châteaupane
<i>Rosa sempervirens</i> L.	Millet	les coteaux près les fours à chaux	Chalonnnes ou Chalonnnes-sur-Loire
<i>Rosa sempervirens</i> L.	Millet		Saint-Barthélémy
<i>Rosa sherardii</i> Davies			
<i>Rosa villosa</i> L.			
<i>Rosa x andegavensis</i> Bastard	Millet	Haies	Angers
<i>Rosa x andegavensis</i> Bastard	Millet	haies et talus de fossés	Jarzé
<i>Rosa x andegavensis</i> Bastard	Millet	haies de la grande route, etc.	Lezigné
<i>Rosa x dumetorum</i> Thuill.	Millet	Haies	Angers
<i>Rumex x pratensis</i> Mert. & W.D.J.Koch	Boreau	Lieux frais, prés	Bords de la loire
<i>Rumex x pratensis</i> Mert. & W.D.J.Koch	Millet	lieux frais	Ingrandes
<i>Rumex x pratensis</i> Mert. & W.D.J.Koch	Millet	lieux humides	Saint-Rémy-la-Varenne
<i>Ruta graveolens</i> L.	Millet	Fourneux et ses environs	Dampierre
<i>Ruta graveolens</i> L.	Boreau	Lieux arides, vieilles murailles	Rochers de parnai à , Champigny-le-sec, Ruines de saint-macé à trèves à Trèves, Saint-pierre-en-vaux
<i>Ruta graveolens</i> L.	Millet	Plantes de Saint-Pierre-en-Vaux	Saint-Georges-le-Toureil
<i>Ruta graveolens</i> L.	Millet		Souzay
<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Millet	Buttes ou landes de Blou ainsi que de Neuillé	Blou
<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Boreau	Pelouses humides	Étangs de chaloché à Chaumont
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Millet	Bords de l'étang de Beaurepaire, rive droite de l'étang	Cléré
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Boreau	Pelouses humides	Forêt de fontevrault à , La Breille, Allonnes, Vernantes, Étang de chevigné à , Étang beaurepaire, Nueil
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Millet	Landes au-dessus de l'étang du Bellay	La Breille
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Millet		Nueil-sous-Passavant
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Millet	bord de l'étang de Passavant	Passavant
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Millet		Saint-Cyr-en-Bourg

<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Millet	bords de l'étang de Cheigné	Saint-Georges-sur-Loire
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Millet		Vernantes
<i>Salix x sepulcralis</i> Simonk.	Corillion		
<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.			
<i>Salsola kali</i> L. subsp. <i>kali</i>	fvma	bord de Loire	
<i>Salvia sclarea</i> L.	Boreau	Lieux secs	Angers, Villevêque, Seiches, Cheffes, Tiercé, Pontigné, Longué, Allonnes, Champigny-le-sec, Montreuil-Bellay, Doué, etc
<i>Salvia sclarea</i> L.	Millet		Beaufort ou Beaufort-en-Vallée
<i>Salvia sclarea</i> L.	Millet	sur le coteau ouest de la ville	Brissac
<i>Salvia sclarea</i> L.	Millet	les décombres du vieux château	Champtocé
<i>Salvia sclarea</i> L.	Millet	Terrain calcaire	Doué ou Doué-la-Fontaine
<i>Salvia sclarea</i> L.	Millet		Longué
<i>Salvia sclarea</i> L.	Millet	lieux incultes, entre Montreuil et le château de la Salle	Montreuil-Bellay
<i>Salvia sclarea</i> L.	Millet	Localités diverses	Pontigné
<i>Salvia sclarea</i> L.	Millet		Souzay
<i>Salvia sclarea</i> L.	Millet	Terrain calcaire, lieux incultes près le bourg	Tigné
<i>Salvia sclarea</i> L.	Millet	Les environs du bourg	Villevêque
<i>Salvia verticillata</i> L.			
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Préaubert, 1930 à 1931	vallée du Lathan, près de la gare	longué
<i>Saxifraga cymbalaria</i> L. subsp. <i>huetiana</i> (Boiss.) Engl. & Irmsch.			
<i>Schoenus nigricans</i>	Préaubert, 1930 à 1931	marais de Prêle	Distré
<i>Scirpus cespitosus</i>	Préaubert, 1902	dans le thalweg des étangs supérieurs, en bordure du bassin de M. Pelletier, rive gauche (talus tourbeux sur 250 m de long : Lg. O. 2G 52' 70" ; Lt. 52G 61' 40")	la Breille
<i>Scirpus holoschoenus</i> L.	Corillion	sables de Loire	Juigné-sur-Loire
<i>Scolymus hispanicus</i> L.	Boreau		Brain-sur-l'Authion
<i>Scutellaria albida</i> L.	Boreau	A été semé par Bastard, dans une carrière près Chalennes ; il s'y est peu multiplié.	
<i>Sedum dasyphyllum</i> L. subsp. <i>dasyphyllum</i>	Boreau	Vieux murs	Doué
<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix			
<i>Sedum villosum</i> L.	Boreau	Lieux sablonneux	Forêt de fontevault à , Saumur, Marson, Distré, Blou, Briollay, Lué, Gonnord, Cléré, Saint-Maur, Saint-georges-des-Sept-Voies, Cunault, Chenehutte, etc
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Millet	bords de la Verzée	Combrée
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Millet	les prés bordant l'Oudon	La Chapelle-sur-Oudon

<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Boreau	Prés humides	Landes de challain à , Bords de l'oudon, Bords de la verzée, Combrée, Segré
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Millet	les prés bordant l'Oudon	Louvaines
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Millet	bords de la Verzée, ainsi que sur d'autres communes	Noellet
<i>Serapias cordigera</i> L.	Boreau	Prés secs, bois	Côteaux de parnay, de Cléré à Saint-pierre-des-champs
<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq.			
<i>Sibthorpia europaea</i> L.	Boreau	Lieux humides	Candé, Angrie, Pouancé, Bords de la rome, Gesté
<i>Silene armeria</i> L.	Boreau	Lieux sablonneux	Brain-sur-Allonnes, La Breille, Neuillé, Combrée dans les lins
<i>Silene armeria</i> L.	Millet	Landes au-dessus de l'étang du Bellay	La Breille
<i>Silene conica</i> L. subsp. <i>conica</i>	Millet		Beaufort ou Beaufort-en-Vallée
<i>Silene conica</i> L. subsp. <i>conica</i>	Millet	Buttes ou landes de Blou ainsi que de Neuillé	Blou
<i>Silene conica</i> L. subsp. <i>conica</i>	Boreau	Lieux sablonneux	Bords de la loire, Côteaux de saumur à Saumur, Distré, Les Ulmes, Saint-florent, Marson, Brion, Longué, Mazé, Soucelles, etc
<i>Silene conica</i> L. subsp. <i>conica</i>	Millet	Terrain sableux	Brion
<i>Silene conica</i> L. subsp. <i>conica</i>	Millet	Terrain d'alluvions sablonneux, aux environs de la Varenne	Corzé
<i>Silene conica</i> L. subsp. <i>conica</i>	Millet	Terrain calcaire et montueux entre Milly et la fontaine d'Avort	Gennes
<i>Silene conica</i> L. subsp. <i>conica</i>	Millet	Buttes des Provenchères (terrain arénacé-crayeux)	Les Ulmes
<i>Silene conica</i> L. subsp. <i>conica</i>	Millet		Longué
<i>Silene conica</i> L. subsp. <i>conica</i>	Millet		Mazé
<i>Silene conica</i> L. subsp. <i>conica</i>	Millet	Les prés au bord de la Loire	Parnay
<i>Silene conica</i> L. subsp. <i>conica</i>	Millet		Souzay
<i>Silene cretica</i> L.			
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i>	Millet	champs sablonneux près la Volerie	Chaufonds
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i>	Millet	Terrain calcaire	Doué ou Doué-la-Fontaine
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i>	Millet		Les Verchers
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i>	Millet		Saint-Georges-Chatelaisou ou Saint-Georges-des-Mines
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i>	Millet	Bois de Notre-Dame-de-l'Oratoire	Saumur
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i>	Boreau	Lieux secs et sablonneux	Saumur, La haute-vallée à , Doué, Saint-Georges-Chatelaisou, Chalonnnes
<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>schkuhriana</i> (Rchb.) Hagenb.	Boreau	Lieux cultivés	
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Millet	Les environs des Ponts-de-Cé	Les Ponts-de-Cé
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Millet	le long des maisons du bourg	Murs et Erigné

Sisymbrium irio L.	Boreau	Murs, décombres, glacis des levées	Saumur, Saint-Mathurin, Les Ponts-de-Cé, Angers, Chalonnes, Ingrandes
Sisymbrium supinum L.	Boreau	Sables humides	Grèves de la Loire, Saumur, Chalonnes, Ile de la croix
Solanum villosum Mill. subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds			
Sorghum bicolor (L.) Moench	Boreau		
Sparganium minimum	Préaubert, 1924 à 1925	marais des Mottais	Louroux-Béconnais
Sparganium minimum Wallr.	Millet	Etangs ou leurs bords	La Prévière
Sparganium minimum Wallr.	Millet	Landes d'Asnières	Le Louroux-Béconnais
Sparganium minimum Wallr.	Boreau	Etangs	Pouancé, Louroux-Béconnais
Sparganium minimum Wallr.	Millet	Terrain calcaire, ruisseau du Therry, près le moulin du Bois	Sermaise
Spergula nodosa	Préaubert, 1911 à 1913	sablère de la Ténébrière	Villevêque
Spergularia marina (L.) Besser	Préaubert		St-Barthélémy, St-Aubin-de-Juigné, Beaulieu-sur-Layon, Faveraye
Spergularia media (L.) C.Presl	Corillion	Rives de l'étang St-Nicolas	Angers
Spergularia segetalis (L.) G.Don	Boreau	Champs sablonneux	Marcé, Le Vieil-Baugé, Jarzé, Chaumont, Soucelles, Blou, Marson, Pocé, Cunault
Spergularia segetalis (L.) G.Don	Millet	Bords et environs du ruisseau de Grézillon, depuis la Maison-Neuve jusqu'à Baugé (calcaire d'eau douce)	Pontigné
Spergularia segetalis (L.) G.Don	Millet	Lieux cultivés	Soucelles
Spiranthes aestivalis	Préaubert, 1902	aux Trois-Cheminées	Mouliherne
Spiranthes aestivalis	Préaubert, 1902	vallée du Couesnon	Pontigné
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Millet	Etangs de Chaumont et leurs bords	Chaumont
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Millet	Landes de Courléon	Courléon
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Millet	Etang de la Bouquetière et ses bords (terrain tourbeux)	Echemiré ou Echemiré-Rigné
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Millet	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye	La Breille
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Millet	Landes des Pommeraies. Landes cultivées pour la plupart	La Chapelle-Hullin
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Millet	Pré tourbeux, dit pré de la Couette, situé au nord-est du village de la Briolais	La Chapelle-Hullin
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Millet	Les environs de Chaloché	Marcé
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Boreau	Landes et prés marécageux	Pouancé, Angrie, Combrée, La Chapelle-sur-Oudon, Soucelles, Seiches, Forêt de chambiers, Cheviré, Chaumont, La Breille, Courléon, Brain, Distré
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Millet	Landes de Bré ou landes de	Seiches

		Seiches	
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Millet	Lande ou étang desséché de Piheu	Thorigné
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Millet		Yzernay
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet	Terrain calcaire	Charcé
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet		Corzé
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet	Terrain calcaire	Doué ou Doué-la-Fontaine
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet	Terres calcaires, lieux incultes, près le bourg	Faveraye
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet		Fontaine-Milon
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet		La Meignanne
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet	Terrain calcaire	Les Alleuds ou Saint-Aubin-des-Alleuds
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet	au sud du bourg	Louresse-Rochemenier
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet	route de Morannes au Pé	Morannes
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet	Champs, pelouses, haies et fossés du terrain calcaire	Noellet
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet		Noyant
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet	près de Pierre-Bise	Rochefort ou Rochefort-sur-Loire
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet	métairie de la Masne	Saint-Michel et Chanveau
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet	Les environs de la Genvrie (métairie). Terrain calcaire	Sceaux
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet	Les environs de la Filotière. Terrain calcaire	Sceaux
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet	Lieux incultes	Soucelles
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet	Terres calcaires	Soulaire-et-Bourg
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet		Souzay
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Millet		Vernantes
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Boreau	Champs pierreux des terrains calcaires	
<i>Stachys x ambigua</i> Sm.	Boreau	Bords des eaux	Saumur, Briollay, Angers, Brain-sur-l'Authion, Les Ponts-de-Cé, Iles de la Loire
<i>Stratiotes aloides</i> L.	Boreau	étang St-Nicolas	Angers
<i>Stratiotes aloides</i> L.	Préaubert	levée allant de la gare de Champtocé à Montjean	
<i>Symphytum tuberosum</i> L. subsp. <i>tuberosum</i>			
<i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman			

<i>Thalictrum minus</i> L.	Boreau	Côteaux, levées et îles de la Loire	Parnai, Gohier, Le Marillais, Ile saint-jean-de-la-croix à Saint-Jean-de-la-Croix
<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>majus</i> (Crantz) Hook.f.	Boreau	Iles de la Loire	Ile saint-jean
<i>Thymus vulgaris</i> L.			
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>neglecta</i> (Rouy & E.G.Camus) Thell.	Millet	champs, bord des bois	Durtal
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>neglecta</i> (Rouy & E.G.Camus) Thell.	Boreau	Champs calcaires	Montigné
<i>Trachelium caeruleum</i> L. subsp. <i>caeruleum</i>	fvma		beaupréau
<i>Tragopogon porrifolius</i> L. subsp. <i>porrifolius</i>	Boreau		Les Ulmes
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak.	Millet		Gennes
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak.	Millet		Pontigné
<i>Trifolium arvense</i> L. subsp. <i>gracile</i> (Thuill.) Nyman	Boreau	Lieux sablonneux	Bords de la loire
<i>Trifolium arvense</i> L. subsp. <i>gracile</i> (Thuill.) Nyman	Millet	La guerouas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain calcaire)	Martigné-Briand
<i>Triglochin palustris</i> L.	Millet		Brezé
<i>Triglochin palustris</i> L.	Millet	Etangs de Chaumont et leurs bords	Chaumont
<i>Triglochin palustris</i> L.	Millet	Landes de Courléon	Courléon
<i>Triglochin palustris</i> L.	Millet	Prés marécageux ou tourbeux au nord de Denezé	Denezé ou Denezé-sous-le-Lude
<i>Triglochin palustris</i> L.	Millet	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye	La Breille
<i>Triglochin palustris</i> L.	Boreau	Lieux tourbeux	La Breille, Courléon, Brezé, Bords de la dive, Distré, Marson, Le thoueil, Denezé, Chaumont, Pontigné
<i>Triglochin palustris</i> L.	Millet	Pré tourbeux de la Bouillant	La Chapelle-Hullin
<i>Triglochin palustris</i> L.	Millet	Les environs de Chaloché	Marcé
<i>Triglochin palustris</i> L.	Millet	Bords du Couasnon : prés tourbeux, près le moulin de Choissellier	Pontigné
<i>Triglochin palustris</i> L.	Millet	Etang de Marson	Rou-Marson
<i>Triglochin palustris</i> L.	Millet		Thorigné
<i>Triglochin palustris</i> L.	Millet	L'étang Penay et ses bords, semi-tourbeux	Tiercé
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	Boreau	Champs calcaires	Saumur, Distré, Aubigné, Martigné, Saint-remy, Pellouailles, Seiches, Chaloché, Baugé, etc
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Millet	les décombres, etc.	Candé
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Millet	bord des murs	Chenehutte-les-Tuffeaux

<i>Urtica pilulifera</i> L.	Boreau	Bords des murs	Côteaux de la Loire, Les tuffeaux, Varrains, Chacé, de Montsoreau à Saumur
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Millet	Terrain calcaire, autour de la ville	Doué ou Doué-la-Fontaine
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Millet	le long des murs, etc.	Montreuil-Bellay
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Millet	au pied des murs du château ; Talus de la Levée du Pont Fouchard, etc.	Saumur
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Millet	au pied des murs, etc.	Varrains
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Millet	champs cultivés	Bauné
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Millet	à Bizé, près Brezé, lieux cultivés	Brezé
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Millet	les moissons	Briollay
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Millet	Près de la tour de Briollay (terrain calcaire)	Briollay
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Millet	champs cultivés, sableux	Mazé
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Millet	parmi les blés, etc.	Saint-Cyr-en-Bourg
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Boreau	Moissons	Saumur, Brezé, Beaufort, Brain, Briollay, La vallée
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Préaubert, 1930 à 1931	crête boisée de la falaise du Loir, entre la ferme de La Bougras et de Vaux (2 hectares !)	Montreuil-sur-Loir
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.			
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.			
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Boreau	Lieux secs des calcaires	Rochers de Beaulieu à , Chalennes, Savennières
<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.			
<i>Veronica scutellata</i> L. var. <i>pilosa</i> Vahl	Boreau		Forêt d'ombrée, Chaloché
<i>Veronica spicata</i> L. subsp. <i>spicata</i>	Boreau	Bois, pelouses montueuses	Landes de Courléon à
<i>Veronica teucrium</i> L. subsp. <i>teucrium</i> var. <i>bastardii</i> (Boreau) Franch.	Boreau	Collines calcaires	Chalennes, Chaudfonds, Baugé, Chaumont, Rou, Fontevrault, Aubigné, etc
<i>Vicia articulata</i> Hornem.	Préaubert		La Possonnière
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	Boreau	Champs calcaires	Saumur, Dampierre, Champigny-le-sec, Brezé, Varrains, Distré, Les Ulmes, Doué, La pointe
<i>Vicia faba</i> L.	Boreau	Bois de Champigny-le-sec à	
<i>Vicia peregrina</i> L.		Champs	Brion, Saint-Sulpice, Brissac, Montreuil-Bellay, Chaloché
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Celak.			
<i>Viola alba</i> Besser subsp. <i>scotophylla</i> (Jord.) Nyman			
<i>Viola x scabra</i> F. Braun	Boreau	Haies, broussailles	Cheffes, Beaulieu, Lalleu, Villemoisan
<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort.	Millet	Bois de Rou (terrain calcaire, mais sablonneux vers sa partie élevée)	Rou-Marson
<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort.	Boreau	Lieux sablonneux	Saumur, Rou, Aubigné, Brissac, Saint-Maur,

			Chalonnnes, Seiches
X Giflifa subspicata	Boreau	Champs	Beaucouzé, Champs de la rocherie à , Baugé
Xeranthemum cylindraceum	Préaubert, 1906 à 1908	à la Pierre-Gaudry et à Jumeau, au dessus de la Maisonnnette	Faye
Xeranthemum cylindraceum	Préaubert, 1919 à 1921	côte du houiller entre Savonnière et les Mousseaux	Les Verchers
Xeranthemum cylindraceum	Préaubert, 1906 à 1908	la Barre	Saint-Rémy-la-Varenne