28/01/2017

8 découvertes marquantes de l'année 2016 : département de la Sarthe

Conservatoire Botanique National de BREST

Réunion du 28/01/2017
Présentation : Fabien Dortel

Redécouverte pour le TAG

Saint-Pierre-des-Bois

Caucalis platycarpos L. (LR PDL [CR*])

Photos : Danielle Tessier/ Découverte : Fabien Dortel, Adeline Moreau

Redécouverte pour le TAG

Saint-Pierre-des-Bois

Caucalis platycarpos L. (LR PDL [CR*])

Découvert le 18/06/2016 dans la champagne du Maine, région agricole sur terrains calcaires à une 20aine de km à l'Ouest du Mans, lors d'une sortie messicoles avec le réseau. En Pays de la Loire, classé En danger critique, peut-être disparu, vu pour la dernière fois en 1991 à Fourneux près Saumur par Robert Corrillion et à la fin du XIXè siècle en Sarthe. Ici plusieurs centaines de pieds sur 200m linéaires en bord de champ d'orge à 6 rang : avec *Stachys annua, Anagallis (Lysimachia) foemina, Euphorbia platyphyllos…*

Photos : Danielle Tessier/ Découverte : Fabien Dortel, Adeline Moreau

Revu

Marigné-Laillé

Cyperus flavescens L. (Pycreus flavescens)

Donnée 2015 : Trouvé dans le secteur en 1993 par Bernard Tilly (au Nord de la Forêt de Bercé), retrouvé fortuitement par M.banasiak qui n'avait pas connaissance de la donnée de 1993

Photo/Découverte : M.Banasiak

3è commune depuis 20000

Grand-Lucé

Ononis spinosa L..

Surtout cité avant 2000 dans le tiers Ouest de la Sarthe, ici en position excentrée au SE du Mans. Etendard grand (supérieur à 15mm), fleurs solitaires à l'aisselles de rameaux réduits à des épines : tige peu ramifiée. Tiges rougeâtres

Découverte/Photo : J-F Fleury

2è donnée

Parigné-L’Evêque

Juncus foliosus Desf.

Anthère+filet

Découverte : Hermann Guitton ; Photo : Hermann Guitton, Guillaume Thomassin

2è donnée

Parigné-L’Evêque

Juncus foliosus Desf.



Découverte : Hermann Guitton ; Photo : H. Guitton, G. Thomassin, F. Dortel

2è donnée

Parigné-L’Evêque

Juncus foliosus Desf.

Graines J.bufonius pour comparaison : lisses à ridées

Anthère+filet J.bufonius

Découverte : Hermann Guitton ; Photo : H. Guitton, G. Thomassin, F. Dortel

2è donnée

Parigné-L'Evêque

Juncus foliosus Desf.

Graines J.bufonius pour comparaison : lisses à ridées



Tout près du Mans au SE. Méconnue en Sarthe, la donnée de 1998 n'étant pas confirmé dans l'Atlas de G.Hunault, n'excluant pas des confusions avec des formes robustes de *J.bufonius*. Les graines nettement striées (avec stries transversales fines en plus) permettent de discriminer *foliosus* du groupe de *bufonius (ranarius, hybridus, bufonius)*. Les rameaux flexueux, les feuilles longues de plus de 12cm et larges de plus de 1,5mm, Les stries noires (facultatives) sur les tépales), l'anthère largement plus longue que le filet, sont des critères complémentaires important à noter (pas mal d'intermédiaires voir hybrides ?).

Anthère+filet J.bufonius

Découverte : Hermann Guitton ; Photo : H. Guitton, G. Thomassin, F. Dortel

Parigné-L'Evêque

1ère donnée pour le territoire d'Agrément

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. subsp. *subtriflora* (Lag.) Ehr.Bayer & G.López

Découverte/Photo : Hermann Guitton

Parigné-L'Evêque

1ère donnée pour le territoire d'Agrément

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. subsp. *subtriflora* (Lag.) Ehr.Bayer & G.López

Sous-espèce méconnue est probablement très rare en France (quelques observations en Auvergne), des milieux hygrophiles. Limbe des innovation convolutées < 1mm de diamètre et 5-9 faisceaux vasculaires (vs 7-15 chez les autres ssp).

Découverte/Photo : Hermann Guitton

2è donnée récente

Parigné-L’Evêque

Agrostis gigantea Roth

Découverte/Photos : Hermann Guitton

2è donnée récente

Parigné-L’Evêque

Agrostis gigantea Roth

Méconnue en Sarthe., une seule donnée de 2001 par G.Hunault. Grand agrostis dressé, Plante à rhizomes, rameaux étalés à + de 30° (contrairement à A.stolonifera ou rameau restent plus appliqués et qui n’a pas de rhizomes mais des stolons)

Découverte/Photos : Hermann Guitton

Saint-Mars-la-Brière

Carex elongata L.

2è localité

Découverte/Photo : Adeline Lepoultier

3è localité récente (1ère depuis 2000)

Spay

Limosella aquatica

Mares temporaires au niveau de dépressions très peu profondes (qq cm), sur substrat sablo-argileux (terrain décapé). La surface est de l'ordre de qq centaines de m2. La Limoselle y est relativement abondante (qq centaines à qq milliers de pieds ?). Milieu atypique pour cette espèce des niveaux bas des grèves d'étangs !

Découverte/photo : Didier Voeltzel

…il reste encore beaucoup à découvrir…

Conservatoire Botanique National de Brest