

Gratiolle officinale



© CBNB, G. Masson

FAMILLE : Plantaginaceae

SYNONYMES :

/

NOMS VERNACULAIRES :

Gratiolle officinale

Herbe au pauvre homme

TYPE BIOLOGIQUE : hémicryptophyte

TAILLE : 10 - 60 cm

FLORAISON : mai - octobre

STATUTS DE RARETÉ ET DE MENACE :

- Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine : préoccupation mineure (UICN France & FCBN & AFB & MNHN (éds), 2018) ;
- Liste « rouge » des espèces végétales rares et menacées du Massif armoricain – annexe 1 (Magnanon, 1993) ;
- Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne : vulnérable (Quéré et al., 2015).

STATUT RÉGLEMENTAIRE :

- Espèce protégée au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982 modifié par arrêté du 31 août 1995).

Anciennement incluse dans la famille des Scrofulariaceae, la Gratiolle officinale est aujourd'hui considérée comme une espèce de la famille des Plantaginaceae. Des études phylogénétiques récentes suggèrent cependant un possible rattachement aux Linderniaceae ; le positionnement taxonomique de la plante peut donc être amené à évoluer.

Certains cortèges hébergeant l'espèce, tel que le *Gratiolo officinalis* – *Oenanthetum fistulosae*, constituent des groupements végétaux particulièrement originaux, à forte valeur patrimoniale.

© CBNB, J. Le Bail

Gratiola officinalis L.



Description

La Gratiolle officinale est une plante vivace glabre de couleur vert-bleuté, à souche rhizomateuse rameuse. Les tiges, creuses, mesurent 10 à 60 cm de haut ; d'abord couchées puis redressées, elles présentent dans leur partie sommitale 4 angles alors que leur base est cylindrique. Les feuilles sont opposées, sessiles et demi-embrassantes ; elles sont de forme lancéolée et dentées en scie dans leur moitié supérieure, elles présentent 3 à 5 nervures partant de la base de la feuille. Leur axe d'insertion pivote de 90° à chaque nœud, donnant à la plante un aspect « en croix » vue du dessus.

Les fleurs sont solitaires et portées par un pédoncule filiforme naissant à l'aisselle des feuilles, plus court que celles-ci. Chaque fleur mesure 15 à 18 mm et présente 5 sépales linéaires-lancéolés ne dépassant pas la moitié de la corolle ; cette-dernière est de couleur rosée à lilas pâle avec un tube jaunâtre, strié et poilu à l'intérieur, se terminant par 5 lobes arrondis. Le fruit est une capsule qui atteint la taille des sépales.

Confusions possibles

Dans les milieux naturels où elle se développe en Bretagne, la Gratiolle officinale est assez facilement reconnaissable à ses grosses fleurs solitaires en tube.

A l'état végétatif, des similitudes existent avec deux espèces de véroniques qui peuvent s'observer dans les mêmes milieux naturels : la Véronique mouron d'eau (*Veronica anagallis-aquatica*) et la Véronique à écusson (*V. scutellata*). Si elles développent aussi des feuilles sessiles opposées, ces véroniques se reconnaîtront cependant à leur couleur verte non bleutée et à leurs feuilles plus allongées voire linéaire lancéolées, plus finement dentées et à nervures plus nombreuses et ramifiées. Fleuries, ces véroniques se distingueront facilement de la Gratiolle officinale par leurs longues grappes de fleurs, prenant naissance à l'aisselle des feuilles.



Gratiola officinalis



Veronica anagallis-aquatica



Veronica scutellata

© CBNB, G. Masson

Écologie

En Bretagne, la Gratiolle officinale s'observe en prairies méso- à eutrophes (moyennement riches, à riches en éléments nutritifs) longuement inondables, notamment au sein de grandes vallées (Vilaine, Oust). Elle se rencontre également en végétations herbacées de bords de rivières ou de plans d'eau.




Pelouses et prairies



Les prairies permanentes humides abritant la Gratiolle officinale sont en forte régression

Répartition de l'espèce en Bretagne



COMMUNES OÙ L'ESPÈCE EST PRÉSENTE EN BRETAGNE

(observations postérieures à 2000) :

ILLE-ET-VILAINE : Bains-sur-Oust, Châtillon-en-Vendelais, Chelun, La-chapelle-de-Brain, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Redon, Saint-Just, Sainte-Anne-sur-Vilaine

MORBIHAN : La Gacilly, Loyat, Ploërmel, Saint-jean-la-Poterie, Saint-Vincent-sur-Oust, Taupont

Atteintes et menaces identifiées en Bretagne

La régression de la Gratiolle officinale en Bretagne semble principalement liée :

- Aux changements de pratiques de gestion des prairies inondables : arrêt de la fauche au profit de la mise en pâturage, voire abandon de la gestion agropastorale menant à la fermeture de la végétation. Des actions de drainage, de remblais, l'utilisation d'intrants agricoles divers, le travail superficiel du sol voire le labour pour la mise en culture entraîneront également la dégradation voire la destruction des cortèges prairiaux hébergeant la Gratiolle.
- À la concurrence végétale, notamment par les espèces exotiques envahissantes (Jussie faux-pourpier et Jussie à grandes fleurs en particulier) en contexte de bords de plan d'eau ou de rivière.
- À des changements pouvant avoir une origine plus globale : la diminution progressive de la durée d'inondation par exemple. Une augmentation trop marquée du niveau trophique du substrat et des masses d'eau pourrait également être défavorable, bien que la Gratiolle semble tolérer une certaine eutrophisation.


Ces menaces ne semblent pas spécifiques à la région, et s'observent de façon généralisée sur le territoire français.

Gestion actuelle et préconisations

Les mesures de gestion optimales pour cette espèce sont celles permettant le maintien de son habitat en bon état de conservation :

- Maintien des prairies permanentes humides, non destruction de ces milieux par artificialisation des sols, remblais ou mise en culture.
- Gestion agropastorale adaptée aux cortèges végétaux en place : fauche estivale préférentiellement (l'espèce ne semble pas tolérer le piétinement et l'abroussissement induits par le pâturage) avec exportation, utilisation d'intrants à proscrire.
- Maintien et non-perturbation du fonctionnement hydraulique de ces milieux : éviter toute action de drainage sur et à proximité des stations de l'espèce, ne pas modifier le régime d'inondations des sites, etc.

RÉPARTITION EN FRANCE



RÉPARTITION MONDIALE :

La Gratiolle officinale présente une large aire de répartition discontinue sud- et centre-européenne à ouest-asiatique, avec d'importants foyers de population en Europe de l'Ouest et des populations plus disséminées jusqu'en Russie du sud.



© CBNB, G. Maillon

Plus d'informations sur la plante à partir du [catalogue documentaire du CBN de Brest](#)