

# Achillée sternutatoire



© CBNB, C. Bougault

FAMILLE : Asteraceae

SYNONYMES :

*Achillaea ptarmica* L.

NOMS VERNACULAIRES :

Achillée sternutatoire

Achillée ptarmique

Herbe à éternuer

TYPE BIOLOGIQUE : Hémicryptophyte

TAILLE : 20-90 cm

PERIODE FLORAISON : Juillet - Septembre


STATUTS DE RARETÉ ET DE MENACE :

- **Aucun**

STATUTS RÉGLEMENTAIRES :

- **Aucun**

RÉPARTITION EN FRANCE



Source : <http://silvres.fcbn.fr>, consulté le 20/10/2020

■ date ≥ 2000   ■ 1950 ≤ date < 2000   ■ date < 1950

© CBNB, T. Bousquet

# *Achillea ptarmica* L.



## Description

**Type végétatif** : Plante herbacée pérenne

**Port** : Tige dressée, simple ou ramifiée au sommet


**Système racinaire** : Souche ligneuse rampante

**Feuilles** : Feuilles simples, linéaires-lancéolées (jusqu'à 8 cm de long pour moins de 1 cm de large) et finement dentées sur toute leur longueur, alternes et sessiles

**Inflorescence** : Corymbe de capitules

**Fleurs** : Fleurs ligulées blanches, tridentées et arrondies, fleurs tubulées du disque blanc-verdâtre

**Fruits** : Akènes




© Dessins : Flore de Coste

## Milieu de vie

Roselières basses des bords des eaux, des mares et des fossés où elle pousse souvent les pieds dans l'eau.

## Répartition de l'espèce en Bretagne



Source : base *Calluna*, CBNB, 20/10/2020  
Carte de répartition actualisée en ligne sur [eCalluna](http://eCalluna)



## Confusions possibles

Il existe un risque de confusion avec l'Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L.), espèce courante en Bretagne mais non indicatrice de zone humide.



© CBNB, T. Bousquet

*Achillea ptarmica*

Critères distinctifs :

- Possède des capitules beaucoup moins nombreux et écartés
- Les feuilles sont simples et dentées



© CBNB, C. Bougault

*Achillea millefolium*

Critères distinctifs :

- Possède des capitules beaucoup plus nombreux et rapprochés
- Les feuilles sont plus découpées (2-3 niveaux de division)