

Potentille ansérine



© CBNB, C. Zambettakis

FAMILLE : Rosaceae

SYNONYMES :

Potentilla anserina L.

NOMS VERNACULAIRES :

Potentille ansérine

Potentille des oies

TYPE BIOLOGIQUE : Hémicryptophyte à rosette

TAILLE : 5-40 cm

PERIODE FLORAISON : Mai - Septembre


STATUTS DE RARETÉ ET DE MENACE :

- *Aucun*

STATUTS RÉGLEMENTAIRES :

- *Aucun*

RÉPARTITION EN FRANCE



■ date ≥ 2000 ■ 1950 ≤ date < 2000 ■ date < 1950

Source : <https://siflore.cbnb.fr>, consulté le 20/10/2020

© CBNB, M. Hardegen

Argentina anserina (L.) Rydb.



Description

Type végétatif : Plante herbacée pérenne

Port : Tiges florifères très grêles, rampantes, stoloniformes

Système racinaire : Souche brune, courte

Feuilles : Feuilles découpées en 7-25 folioles longues de 3-6 cm et folioles opposées entre-elles (sauf celle du sommet) ; dentées, soyeuses-argentées au moins en dessous ; en haut de la tige les feuilles sont plus courtes et avec moins de folioles

Inflorescence : Fleurs axillaires, solitaires

Fleurs : Fleurs jaunes à 5 pétales et 5 sépales, longuement pédonculées et larges d'env. 2 cm


Fruits : Akènes bruns, glabres, lisses

Milieu de vie

Prairies humides, bord des eaux, chemins, entrées de pâtures et sites rudéralisés frais.

La Potentille ansérine indique des sols riches en éléments organiques.

Répartition de l'espèce en Bretagne



■ Observations postérieures à 2000
■ Observations antérieures à 2000

Source : base *Calluna*, CBNB, 20/10/2020
Carte de répartition actualisée en ligne sur [eCalluna](https://siflore.cbnb.fr)



Confusions possibles

La Potentille ansérine (*Argentina anserina* (L.) Rydb.) est facile à distinguer des autres potentilles grâce à la forme caractéristique de ses feuilles découpées en 7-25 folioles opposées entre-elles et à sa couleur glauque.

Par exemple, la Potentille rampante (*Potentilla reptans* L.) possède des feuilles à 5 folioles digitées. Cette dernière n'est pas indicatrice de zone humide.



Potentilla reptans

Critères distinctifs : feuilles pétiolées, digitées, à 5 folioles obovales en coin, vertes, peu velues, dentées presque tout autour, à dent terminale plus petite



Argentina anserina

Critères distinctifs : feuilles découpées en 7-25 folioles longues de 3-6 cm, opposées 2 à 2 (sauf celle du sommet), dentées, soyeuses-argentées au moins en dessous ; en haut de la tige les feuilles sont plus courtes et avec moins de folioles