

Bident tripartite



© CBNB, J. Le Bail

FAMILLE : Asteraceae

SYNONYMES :

NOMS VERNACULAIRES :

Bident trifoliolé

Eupatoire aquatique

TYPE BIOLOGIQUE : Thérophyte

TAILLE : 20-110(-150) cm

PERIODE FLORAISON : Juillet - Octobre


STATUTS DE RARETÉ ET DE MENACE :

- *Aucun*

STATUTS RÉGLEMENTAIRES :

- *Aucun*

RÉPARTITION EN FRANCE



■ date ≥ 2000 ■ 1950 ≤ date < 2000 ■ date < 1950

Source : <https://siflore.fcbn.fr>, consulté le 20/10/2020

© CBNB, E. Laurent

Bidens tripartita L.



Description

Type végétatif : Plante herbacée annuelle

Port : Dressé


Système racinaire : Racines simples s'arrachant facilement

Feuilles : Feuilles pour la plupart composées-pennées à 3(-5) folioles ou profondément découpées, dentées, à pétioles ailés, vert foncé

Inflorescence : Corymbes de capitules lâches (à rameaux étalés), entourés de 5-8 bractées externes

Fleurs : Fleurs jaunes toutes tubulées

Fruits : Akènes surmontés de 2-3 arêtes (plus rarement 4)




© Dessins : Flore de Coste

Milieu de vie

Pelouses amphibies des berges d'étangs, des cours d'eau et des mares temporaires. Ces pelouses se développent en fin d'été, lorsque les niveaux d'eaux sont les plus bas.

Le *Bident tripartite* se rencontre aussi dans des dépressions au sein de prairies humides.

Répartition de l'espèce en Bretagne



Source : base *Calluna*, CBNB, 20/10/2020
Carte de répartition actualisée en ligne sur [eCalluna](https://siflore.fcbn.fr)



Confusions possibles

Il existe un risque de confusion avec d'autres espèces du genre *Bidens* présent en Bretagne, notamment le Bident feuillu (*Bidens frondosa* L.) et le Bident radié (*Bidens radiata* Thuill.), qui possèdent aussi des feuilles composés. Les autres espèces de bidents ont des feuilles simples.

Parmi les bidents à feuilles composées, le Bident tripartite (*Bidens tripartita* L.) est le seul à avoir un pétiole ailé **ET** 5-8 bractées à la base des capitules (attention : les jeunes individus peuvent avoir des feuilles simples et une confusion est alors possible avec le Bident à feuilles connées, *Bidens connata* Muhl. ex Willd.).

Le Bident feuillu (*Bidens frondosa* L.) est une espèce introduite, classée « invasive avérée » en Bretagne (Quéré *et al.*, 2016 - https://www.cbnbrest.fr/pmb_pdf/CBNB_Quere_2016b_63312.pdf).

Toutes ces espèces sont indicatrices de zone humide et figurent sur l'Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.



© CBNB, V. Colasse

Bidens tripartita

Critères distinctifs :

- Capitules plus hauts que larges, entourés de 5-8 bractées externes
- Pétioles ailés et feuilles pennées



© CBNB, V. Colasse

Bidens radiata

Critères distinctifs :

- Capitules plus larges que hauts, entourés de 10-12 bractées externes
- Pétioles ailés et feuilles pennés



© CBNB, V. Colasse

Bidens frondosa

Critères distinctifs :

- Capitules aussi hauts que larges, entourés de 10-12 bractées externes
- Pétioles non ailés et feuilles composées