

Laîche noire



© CBNB, J. Geslin

FAMILLE : Cyperaceae

SYNONYMES :

Carex vulgaris Fries

NOMS VERNACULAIRES :

Laîche noire

Laîche vulgaire

TYPE BIOLOGIQUE : Hélophyte ou hémicryptophyte cespiteux

TAILLE : 10-60 cm

PERIODE FLORAISON : Avril - Juin


STATUTS DE RARETÉ ET DE MENACE :

- *Aucun*

STATUTS RÉGLEMENTAIRES :

- *Aucun*

RÉPARTITION EN FRANCE



■ date≥2000 ■ 1950≤date<2000 ■ date<1950

© CBNB, A. Lieurade

Carex nigra (L.) Reichard



Description

Type végétatif : Plante herbacée pérenne

Port : Tige dressée, assez grêle


Système racinaire : Souche rampante, stolonifère

Feuilles : Feuilles linéaires larges de 1-3(-5) mm, égalant souvent la tige, ou plus petites

Inflorescence : Epis mâles/femelles distincts : épis mâles au sommet du chaume et épis femelle en dessous, les femelles à utricules régulièrement disposés sur 6 rangées longitudinales

Fleurs : Fleurs mâles réduites aux étamines, les femelles à 2 stigmates sortant de l'utricule. Utricules glabres, elliptiques, comprimés, obtus, verts, à bec très court, dépassant de l'écaille noirâtre, très obtuse, à nervure médiane verte

Fruits : Akènes




Milieu de vie

Tourbières actives et prairies tourbeuses. Egalement en dépressions arrière-ducales.

La Laîche noire est une espèce pionnière qui indique des sols plutôt acides et pauvres à moyennement riches en éléments nutritifs.

Répartition de l'espèce en Bretagne



■ Observations postérieures à 2000
■ Observations antérieures à 2000

Source : base *Calluna*, CBNB, 20/10/2020
Carte de répartition actualisée en ligne sur eCalluna




Confusions possibles

Il existe un risque de confusion avec la Laîche élevée (*Carex elata* All.) ainsi qu'avec la Laîche aiguë (*Carex acuta* L.).

Toutes ces espèces sont indicatrices de zone humide et figurent sur l'Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

	<i>Carex elata</i> All.	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	<i>Carex acuta</i> L.
Taille (cm)	30-100 cm	10-60 cm	50-100 cm
Structure de colonie	Souche fibreuse, très gazonnante, formant des touradons	Souche rampante, stolonifère	Souche rampante, stolonifère
Bractées	Bractées plus courtes que l'inflorescence	Bractées plus courtes à un peu plus longues que l'inflorescence	Bractées inférieures normalement plus longues que l'inflorescence
Epis ♂	1-2(3) épis, longs de 2-5(-9) cm	1 épi (parfois 2), longs de 0,5-3 cm	2-4 épis, longs de 2-5 cm
Epis ♀	2-3 épis, longs de 1,5-7 cm, généralement se recouvrant	1-3(-4) épis, longs de 1-4(-5) cm, se recouvrant ou l'inférieur distant des autres	2-5(-6) épis, longs de 5-10cm
Utricules	2,5-4 mm, dépassant l'écaille de toutes parts	2-3,5 mm, dépassant l'écaille	2-3,5 mm, plus courts ou plus longs que l'écaille
	Alignés longitudinalement sur 8 rangs	Alignés longitudinalement sur 6 rangs	-
	Verdâtres	Verts à bruns entourés de vert	Verdâtres
Ecailles des fl. ♀	Noires à nervure pâle, sans marge scarieuse	Vertes ou noires à nervure verte, parfois à marge étroite	Brunâtres lancéolées
Tige	Robuste, trigone à faces creuses, scabre sur toute la longueur	Assez grêle, trigone, scabre seulement au sommet	Trigone, à faces planes, scabre sur toute la longueur
Feuilles	Feuilles étroites, généralement certaines > 3 mm de large mais < 6 mm, n'atteignant pas le sommet de l'inflorescence	Feuilles plus étroites, souvent < 3 mm de large, ≤ au sommet de l'inflorescence	Feuilles de printemps ≥ 5 mm, celles d'été entre 7-10 mm
Ligule	Ligule 5-10 mm, ovale, aiguë	Ligule 1-3 mm, ovale, arrondie ou plus ou moins aiguë	Ligule 5-10 mm, ovale, aiguë



Carex elata



Carex nigra



Carex acuta