

Laïche bleuâtre



© CBNB, T. Bousquet

FAMILLE : Cyperaceae

SYNONYMES :

-

NOMS VERNACULAIRES :

Laïche bleuâtre

Laïche faux-panic

TYPE BIOLOGIQUE : Hémicryptophyte

TAILLE : 10-60 cm

PERIODE FLORAISON : Avril - Juin


STATUTS DE RARETÉ ET DE MENACE :

- *Aucun*

STATUTS RÉGLEMENTAIRES :

- *Aucun*

RÉPARTITION EN FRANCE



Source : <http://silvres.fcbn.fr>, consulté le 20/10/2020

■ date ≥ 2000 ■ 1950 ≤ date < 2000 ■ date < 1950

© CBNB, A. Lieurade

Carex panicea L.



Description

Type végétatif : Plante herbacée pérenne

Port : Tige dressée


Système racinaire : Souche rampante, stolonifère

Feuilles : Feuilles linéaires larges de (1-)2-4(-6) mm < tige, glauques pruinées

Inflorescence : Epis mâles/femelles distincts : 1 épi mâle solitaire au sommet et ordinairement 2 épis femelles en dessous

Fleurs : Fleurs mâles réduites aux étamines, les femelles à 3 stigmates sortant de l'utricule. Utricules glabres, ovoïdes, renflés, olivâtres, sublisses, brusquement contractés en bec court, tronqué, dépassant de l'écaille brun foncé à noirâtre avec des bords plus ou moins transparents

Fruits : Akènes




© Flore de Coste

Milieu de vie

Prairies et landes tourbeuses, tourbières et bois humides.

La Laïche bleuâtre préfère les sols acides mais possède une large amplitude écologique.

Répartition de l'espèce en Bretagne



■ Observations postérieures à 2000
■ Observations antérieures à 2000

Source : base *Calluna*, CBNB, 20/10/2020
Carte de répartition actualisée en ligne sur eCalluna



Confusions possibles

Il y a un risque de confusion avec la Laîche glauque (*Carex flacca* Schreb.) et La Laîche tomenteuse (*Carex tomentosa* L.). Ces deux autres laîches ne sont pas caractéristiques de zone humide.

La Laîche glauque (*Carex flacca* Schreb.) se distingue par son inflorescence à plusieurs épis mâles, ses feuilles glauques uniquement sur la face inférieure, les feuilles se terminant en pointe très régulièrement effilée et à nervure se prolongeant à l'apex.

La Laîche tomenteuse (*Carex tomentosa* L.) se différencie par ses utricules couverts de poils fins, ses épis femelles plus petits et rapprochés de l'épi mâle et à sa bractée inférieure généralement perpendiculaire à la tige.



© CBNB, H. Guitton

Carex flacca



© CBNB, E. Vallez

Carex tomentosa