

Campanille à feuilles de lierre



© CBNB, J. Le Bail

FAMILLE : Campanulaceae

SYNONYMES :

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.

NOMS VERNACULAIRES :

Campanille à feuilles de lierre

Wahlenbergie

TYPE BIOLOGIQUE : Chaméphyte herbacé

TAILLE : 10-30 cm

PERIODE FLORAISON : Juin - Août


STATUTS DE RARETÉ ET DE MENACE :

- Aucun

STATUTS RÉGLEMENTAIRES :

- Aucun

RÉPARTITION EN FRANCE



■ date ≥ 2000 ■ 1950 ≤ date < 2000 ■ date < 1950

Source : <http://siflore.cbnb.fr>, consulté le 20/10/2020

© CBNB, J. Le Bail

Hesperocodon hederaceus (L.) Eddie & Cupido



Description

Type végétatif : Plante herbacée pérenne

Port : Tige grêle, filiforme, couchée

Système racinaire : Racine rampante

Feuilles : Feuilles alternes, très minces, à limbe de 5-15 mm, en forme d'étoile à 5-7 lobes (le médian plus grand), pétiolées, qui rappellent la forme de la feuille du lierre

Inflorescence : Fleurs solitaires, axillaires

Fleurs : Fleurs longuement pédicellées (2-4 cm), en cloche avec 5 lobes superficiellement divisés, 5 petits sépales à la base de la corolle

Fruits : Capsules d'environ 3 mm de long, dressées et rétrécies à la base



© Flore de Coste


Wahlenbergia hederacea

Milieu de vie

Prairies humides, bords des ruisseaux, tourbières et chemins forestiers humides.

La Campanille à feuilles de lierre indique des sols acides.

Répartition de l'espèce en Bretagne



■ Observations postérieures à 2000
■ Observations antérieures à 2000

Source : base *Calluna*, CBNB, 20/10/2020
Carte de répartition actualisée en ligne sur eCalluna



Confusions possibles

Aucune confusion possible, grâce aux feuilles très caractéristiques.



© CBNB, H. Guitton

Feuilles de *Wahlenbergia hederacea*



© CBNB, J. Le Bail

Fleurs de *Wahlenbergia hederacea*