

Lotier des marais



© CBNB, J. Geslin

FAMILLE : *Plantaginaceae*

SYNONYMES :

Lotus uliginosus Schkuhr

NOMS VERNACULAIRES :

Lotier des marais

Lotier des fanges

TYPE BIOLOGIQUE : Hémicryptophyte

TAILLE : 30-80 cm

PERIODE FLORAISON : Juin - Septembre


STATUTS DE RARETÉ ET DE MENACE :

- *Aucun*

STATUTS RÉGLEMENTAIRES :

- *Aucun*

RÉPARTITION EN FRANCE



Source : <http://siflore.cbnb.fr>, consulté le 20/10/2020

© CBNB, E. Burguin

Lotus pedunculatus Cav.



Description

Type végétatif : Plante herbacée pérenne

Port : Tiges dressées ou ascendantes, très creuses

Système racinaire : Souche longuement rampante

Feuilles : Feuilles à trois folioles glauques en dessous, les deux latéraux dissymétriques à pointe vers le haut, toutes bordées de poils et à nervures latérales bien visibles

Inflorescence : Têtes de 5-12(15) fleurs en haut d'un pédoncule plus haut que la feuille

Fleurs : Fleurs zygomorphes de 10-18 mm, les dents du calice étalées ou réfléchies avant la floraison


Fruits : Gousses droites de 15-35 mm de long

Milieu de vie

Prairies humides à marécageuses, fossés.

Le Lotier des marais possède une large amplitude écologique et se développe sur tous les sols.

Répartition de l'espèce en Bretagne



Source : base *Calluna*, CBNB, 20/10/2020
Carte de répartition actualisée en ligne sur eCalluna



Confusions possibles

Il existe un risque de confusion avec les autres espèces du genre *Lotus*, mais surtout avec le Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* L.) et le Lotier tenu (*Lotus glaber* Mill.) qui ont des fleurs de plus de 9 mm (les autres lotiers ont des fleurs < 8mm de longueur).

Ces deux espèces ne sont pas indicatrices de zone humide.

<i>Lotus pedunculatus</i>	<i>Lotus corniculatus</i>	<i>Lotus glaber</i>
Ombelle de 5-12(15) fleurs, longues de 12-15 mm, rarement teintées de rouge	Ombelle de 2-6 fleurs, longues de 11-13 mm, souvent teintées de rouge	ombelle de 2-5 fleurs, longues de 9-12 mm
Dents du calice arquées vers l'extérieur avant la floraison.	Dents du calice droites ou légèrement arquées vers l'intérieur avant la floraison	Dents du calice droites ou légèrement arquées vers l'intérieur avant la floraison.
Présence d'une lacune centrale dans la partie supérieure du pédoncule	Absence de lacune centrale dans la partie supérieure du pédoncule. Folioles des feuilles supérieures obovales-lancéolées	Absence de lacune centrale dans la partie supérieure du pédoncule.
Folioles obovales en coin	Folioles des feuilles supérieures obovales-lancéolées	Folioles des feuilles supérieures linéaires-lancéolées



Lotus pedunculatus



Lotus corniculatus



Lotus glaber

© Dessins : Flore de Coste