

Choin noirâtre



© CBNB, L. Ruelian

FAMILLE : Cyperaceae

SYNONYMES :

NOMS VERNACULAIRES :

Choin noirâtre

TYPE BIOLOGIQUE : Hémicryptophyte
cespiteux ou hélophyte

TAILLE : 15-80 cm

PERIODE FLORAISON : Mai – Août


STATUTS DE RARETÉ ET DE MENACE :

- Liste « rouge » des espèces végétales rares et menacées du Massif armoricain : **annexe 2** (Magnanon, 1993)

STATUTS RÉGLEMENTAIRES :

- **Aucun**

RÉPARTITION EN FRANCE



Source : <https://silvoflore.cbnn.fr>, consulté le 20/10/2020

■ date ≥ 2000 ■ 1950 ≤ date < 2000 ■ date < 1950

© CBNB, V. Coiasse

Schoenus nigricans L.



Description

Type végétatif : Plante herbacée pérenne

Port : Tiges dressées , en « touffe »


Système racinaire : Souche fibreuse, gazonnante, tenace

Feuilles : Feuilles raides, linéaires-étroites, larges au plus de 1 mm, aussi longues à un peu plus longues que les tiges

Inflorescence : Tête ovale dense composée de (2-)5-12 épillets, en général largement dépassée par la bractée inférieure terminée en pointe

Fleurs : Epillets de couleur noire brunâtre, d'env. 8 mm, aux glumes coriaces entourées d'une marge hyaline claire et dépassées par les stigmates blancs

Fruits : Akènes de 1,5 mm, trigones, blanc luisant




Milieu de vie

Tourbières alcalines et dépressions dunaires humides.

Le Choin noirâtre indique des sols moyennement riches en éléments nutritifs.

Répartition de l'espèce en Bretagne



Source : base *Calluna*, CBNB, 20/10/2020
Carte de répartition actualisée en ligne sur [eCalluna](https://silvoflore.cbnn.fr)



Confusions possibles

Le Choin noirâtre (*Schoenus nigricans* L.) est facile à repérer grâce à son port en touffe et ses épillets noirâtres.



© CBNB, J. Le Bail

Port en touffe de *Schoenus nigricans*