

FINISTERE

21685

Liste rédigée par Franck HARDY

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ayant moins de 10 stations dans le département :

- *Bellardia trixago* : plage des Sables Blancs à Loctudy (Coll., découverte R. Ragot).
- *Bromus commutatus* : Marc'h Sammet à Locquirec (Y.L.G.).
- *Carex punctata* : Lannec à l'Hôpital-Camfrout (J.L.B.).
- *Hammarbya paludosa* : le Roc'h-Trédudon à Plonéour-Ménez (revu, E.Q., S.M., C.B., F.S.). Egalement présent actuellement à Berrien, le Cloître-Saint-Thégonnec, Commana, Saint-Rivoal et Sizun.
- *Lathyrus japonicus* subsp. *maritimus* : Illien an Traon à Plougastel-Daoulas (S.M.).
- *Lotus parviflorus* : Traonliors à Plougastel-Daoulas (revu, J.L.B.).
- *Ophioglossum azoricum* : ouest de Penn an Dreff à Plouarzel (revu, N.A., S.M.). Recherché et non revu à Plougrescant dans les Côtes d'Armor (S.M., com. pers.).
- *Puccinellia rupestris* : Kerlojean à Loperhet (J.L.B.), Lannec à l'Hôpital-Camfrout (J.L.B.). 2^{ème} et 3^{ème} observations récentes dans le département.

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ayant plus de 10 stations dans le département :

- *Linaria arenaria* : plage des Sables Blancs à Loctudy (Coll.).
- *Serapias parviflora* : anse du Bourg à Logonna-Daoulas (J.L.B.), Kertanguy à Lanvéoc (P.H.).
- *Solanum marinum* (*S. dulcamara* var. *marinum*) : île de Quémènes au Conquet (P.H.).
- *Spiranthes aestivalis* : le Clos (tourbière du Relecq) à Plonéour-Ménez (revu, E.Q., S.M., C.B., F.S.), avec *Rhynchospora alba*, *Pinguicula lusitanica*, *Oreopteris limbosperma*, *Scirpus cespitosus* subsp. *germanicus*, *Drosera rotundifolia*...

Autres taxons intéressants à noter :**Indigènes**

- *Alopecurus myosuroides* : Kerlojean à Loperhet (J.L.B.). 3^{ème} localité actuellement connue dans le département.
- *Aristolochia clematitis* : Keranpellan à Moëlan-sur-Mer (revu, M.M.M.).
- *Atriplex longipes* : Maison Blanche à Taulé (V.D.). Nouveau pour le Finistère et le Massif armoricain, également observé pour la première fois dans les Côtes d'Armor et en Ile-et-Vilaine (V.D.). Espèce protégée nationalement qui n'était connue jusqu'à présent, en France, que dans une seule localité située dans le département du Nord, où elle avait été découverte en 1985 (Ph. Danton et M. Baffray, Inventaire des plantes protégées en France, 1995). L'arroche à long pédoncule (*Atriplex longipes*) se rapproche d'*Atriplex hastata* (*A. prostrata*) avec lequel elle s'hybride et d'*Atriplex glabriuscula*, mais en diffère par des bractéoles foliacées de deux types, dimorphes, les unes sessiles ou courtement pédicellées et les autres longuement pédicellées (Danton et Baffray, 1995). A rechercher ailleurs, en particulier sur la côte Nord du Finistère, par exemple dans la baie de Goulven ou les abers.
- *Asperula cynanchica* : île de Quémènes au Conquet (P.H.).
- *Bidens cernua* : Rusquec à Loqueffret (Y.L.G.).
- *Bromus ramosus* : Kerpaulette à Loperhet (J.L.B.). 2^{ème} observation récente dans le Finistère. Fréquente généralement les lisières de haies et de bois frais sur des sols neutres ou basiques (comme *Elymus caninus*, toujours à retrouver dans le Finistère).

- *Callitriche brutia* : Linglaz Izella à Loperhet (J.L.B.), étang du Roual à Dirinon (J.L.B.). 2^{ème} et 3^{ème} observations récentes dans le Finistère.
- *Carex divisa* : Kerloc'h à Loctudy (Coll.).
- *Erodium maritimum* : île de Quémènes au Conquet (P.H.).
- *Festuca gigantea* : vallée Jarlot à Morlaix (Y.L.G.), Traon Dour à Plouégat-Guérand (Y.L.G.), Guéronvel à Lanmeur (Y.L.G.).
- *Gastridium ventricosum* : anse de Keroullé à l'Hôpital-Camfrout (J.L.B.).
- *Gnaphalium luteo-album* : Kerloc'h à Loctudy (Coll.).
- *Juncus ambiguus* : Rossermeur à Plougastel-Daoulas (J.L.B.). Présence actuelle dans le Finistère confirmée.
- *Mentha x verticillata* (*M. aquatica* x *M. arvensis*) : Etang du Roual à Dirinon (J.L.B.). Présence dans le Finistère confirmée.
- *Narcissus pseudo-narcissus* subsp. *pseudo-narcissus* : Goarem Goz à Loperhet (J.L.B.).
- *Puccinellia distans* : Bolast à Rosnoën (J.L.B.). 1^{ère} observation récente dans le Finistère.
- *Rosa stylosa* : Kerlecu (bord de l'Elorn) à Guipavas (J.L.B.), Rubian au Relecq-Kerhuon (J.L.B.), Run à l'Hôpital-Camfrout (J.L.B.). Présence actuelle dans le Finistère confirmée.
- *Ruppia maritima* : Coat ar Poulin à Loperhet (J.L.B.).
- *Salicornia ramosissima* : île de Quémènes au Conquet (P.H.).
- *Scirpus lacustris* subsp. *lacustris* : rivière du Faou (J.L.B.).
- *Scleranthus annuus* : Poulazen à Guipavas (E.Q.).
- *Silene conica* : plage des Sables Blancs à Loctudy (Coll.).
- *Valerianella rimosa* : Lanveur à Loperhet (J.L.B.).
- *Vicia lathyroides* : île de Quémènes au Conquet (P.H.).
- *Vicia lutea* : Kerzinaou à Plougastel-Daoulas (J.L.B.).
- *Vulpia ciliata* subsp. *ciliata* : plage de Cleut Rouz à Fouesnant (F.H.).
- *Vulpia fasciculata* : île Callot à Carantec (M.G.). Détermination avec la Nouvelle Flore de Belgique (5^{ème} édition). Espèce rattachée à *Vulpia membranacea* dans le bordereau d'inventaire Atlas.

Adventices

- *Acanthus mollis* : île Callot à Carantec (M.G.).
- *Allium roseum* : bourg de Lanmeur (Y.L.G.).
- *Artemisia verlotiorum* : Keroumen à Plougastel-Daoulas (J.L.B.). 1^{ère} observation récente dans le département.
- *Cyperus eragrostis* (*C. vegetus*) : Poulazen à Guipavas (E.Q.). 2^{ème} observation récente.
- *Euphorbia humifusa* : bourg de Loctudy sur des graviers à l'entrée d'une maison (Coll., découverte D. Chicouène). Nouveau pour le Finistère.
- *Lavatera cretica* : Kerloc'h à Loctudy (Coll.).
- *Ophrys tenthredinifera* : Presqu'île Sainte-Marguerite à Landeda (Y.Q.). Espèce méditerranéenne protégée nationalement, peut-être rapportée accidentellement par des vacanciers. Nouveau pour le Finistère.
- *Paspalum paspalodes* : Keranpellan à Moëlan-sur-Mer (revu, M.M.M.).
- *Polypogon viridis* (*Agrostis semiverticillata*) : Bourg-Blanc (E.Q.).
- *Prunus padus* : Kervadogan à Taulé (Y.L.G.).
- *Smilax aspera* : Pont ar Vilin Goz (vallée de la Penzé) à Henvic (Y.L.G.). La « salsepareille » est une plante méditerranéenne, probablement échappée de jardin ou introduite volontairement. Nouveau pour le Finistère.
- *Tetragonia tetragonoides* : île Callot à Carantec (M.G.).
- *Vicia bithynica* : Keranpellan à Moëlan-sur-Mer (M.M.M.).

Observations de : N.A. : Nicole Annezo, C.B. : Christophe Bougault, Coll. : Collectif, sortie ERICA (R. Trébaol, D. Chicouène, H. Quénéa, R. Ragot, E. Quéré, F. Hardy), V.D. : Vianney Dalibard, M.G. : Maurice Gérard, P.H. : Patrick Hamon, F.H. : Franck Hardy, J.L.B. : Jacques Le Bohec, Y.L.G. : Yves Le Gall, M.M.M. : M. et Mme Madic, S.M. : Sylvie Magnanon, E.Q. : Emmanuel Quéré, Y.Q. : Yves Quéré, F.S. : François Seité.

ILLE-ET-VILAINE

21682

Liste rédigée par Louis DIARD

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ou protégés réglementairement :

- *Allium schoenoprasum* : La Hillandais à Goven (VL).
- *Atriplex longipes* : nord-ouest de Saint-Buc au Minihic-sur-Rance, près de la Richardais à Pleurtuit (VD).
- *Butomus umbellatus* : étang du Boulet à Feins (SW).
- *Carex rostrata* : Tourbière de Lambrun à Paimpont (PA).
- *Crassula vaillantii* : vallée du Rohuel à Le Verger (BA).
- *Cyperus fuscus* : Nord-est de Pan à Bruz (LD).
- *Damasonium alisma* : revu étang de la Forge à Martigné-Ferchaud (LD).
- *Drosera intermedia* : La Lande Plaine à Andouillé-Neuville (PP).
- *Elatine hexandra* : les Messiers à Chanteloup (PP).
- *Galanthus nivalis* : Le Val à La Fontenelle (LD).
- *Galium debile* : Les Landes de Jaunouse à Billé (CHF).
- *Galium odoratum* : Le Bois de la Motte à Saint-Brice-en-Coglès (LD).
- *Littorella uniflora* : les Messiers à Chanteloup (PP), Le Feuill à Feins, étang du Boulet à Feins, La Marquerais à Montreuil-sur-Ille (SW).
- *Luronium natans* : Bellevue à Montreuil-sur-Ille (SW).
- *Najas marina* : revue à l'étang du Boulet à Feins, étang de Chinsève à Saint-Aubin-d'Aubigné, l'étang Neuf à Guipel (SW).
- *Orchis ustulata* : sud de la Lande Bas à Lassy (VL).
- *Pilularia globulifera* : les Messiers à Chanteloup (PP).
- *Pulicaria vulgaris* : revu à l'étang de la Forge à Martigné-Ferchaud, barrage de Haute-Vilaine à La Chapelle-Erbrée (LD).
- *Ranunculus ololeucos* : les landes de Jaunouse à Billé (CHF).
- *Sedum caespitosum* : près du bourg à Saint-Méen-le-Grand (DC).
- *Sesamoides purpurascens* (*S. canescens*) : la Hillandais à Goven (VL).
- *Trichomanes speciosum* (gamétophyte) : la Ferme Neuve, La Remaudais, le Val, Crésiolan à Sixt-sur-Aff (LD), Saint-Marcellin, la Giraudais, les Touches, le Port-Corbin à Bains-sur-Oust (LD/SL/JPP/GR), le Pont d'apé, l'Hôtel Perroteau, l'Aumônerie, Maupertuis, le Pé à Sainte-Marie, La Bréhaudière à Saint-Séglin, la Moissonnais à Lieuron, Prenhelo à Bruc-sur-Aff (JPP), Catféon, la Piasais à Renac, le Val Hamon, Bosné à Saint-Just, la Saudrais à Pipriac, le Château des Champs à Guipry, Gannedel à la Chapelle-de-Brain (LD).

Autres taxons intéressants pour le département :

- *Allium ursinum* : le Bois des Vieux Champs à Guipry (PT).