

- *Reynoutria sachalinensis* (IP) : Sud de Pegasus Bridge, Ranville (PM) ; L'Hotel au brun, St-Martin-des-Besaces (EH)
- *Senecio inaequidens* (IP) : Le Marais de Venoux, Amfréville (PM).

Légende : *IA* (invasive avérée), *IP* (invasive potentielle) en Basse-Normandie.

Observations de CL : Christelle Lebec, EH : Etienne Hubert, FB : Florent Baude, JL : Julien Lagrandie, LC : Loïc Chéreau, LT : Laetitia Talpaert, PM : Patrick Martin, TB : Thomas Bousquet, YP : Yann Pouvreau.

COTES-D'ARMOR

Liste rédigée par Rémy PRELLI et Daniel PHILIPPON

Taxons à statut

- *Deschampsia flexuosa* (LRA) : flanc nord de Bel-Air à Trébry (MC).
- *Drosera rotundifolia* (PN) : tourbière au nord du bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD).
- *Dryopteris aemula* (PN) : bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD) ; et revu en forêt de Lorge à L'Hermitage (JD).
- *Equisetum sylvaticum* (LRA) : près du Guern au Haut-Corlay (JD) ; et revu en forêt de Lorge à L'Hermitage (JD).
- *Hymenophyllum tunbrigense* (PN) : revu au bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD).
- *Isopyrum thalictroides* (LRA) : vallée du Léguer en forêt de Coat-an-Noz à Belle-Isle-en-Terre (JD).
- *Juniperus communis* (LRA) : bois de la Moussaye à Plénée-Jugon, 1 pied âgé (MC).
- *Pilularia globulifera* (PN) : Lan-Bern à Glomel (PP).
- *Puccinellia rupestris* (LRA) : Traou-Martin à Minihi-Tréguier (DP) ; estuaire du Jaudy à Trédarzac (DP) ; Port-le-Goff à Trévou-Tréguignec (DP).
- *Ranunculus serpens subsp. nemorosus* (LRA) : corniche du Hogolo à Plestin-les-Grèves (DP) ; littoral entre Toul-ar-Vilin et Beg-ar-Forn à Trédrez (DP) ; coteau maritime près de Pont-ar-Roscoat à Tréduder (DP).
- *Rhynchospora alba* (LRA) : tourbière au nord du bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD).
- *Rhynchospora fusca* (LRA) : plusieurs populations autour de Klesseven à Glomel (JD & MH).
- *Trichomanes speciosum* (PN), gamétophyte seul : bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD).
- *Zostera noltii* (LRA) : grève à l'est de Penn-Vir à Pleubian (DP).

Légende : *PN* (protection nationale), *LRA* (liste rouge armoricaine).

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe...)

- *Calamagrostis epigejos* : îlot Karreg-Iliavek à Plougrescant (PH).
- *Carex elata* : revu prairie du Palus à Plouha (DP).
- *Cornus sanguinea* (ouest des Côtes-d'Armor) : plusieurs localités sur Plestin-les-Grèves et Tréduder (DP & PS).
- *Euphorbia exigua* (ouest des Côtes-d'Armor) : entre Rochelan et la Villeneuve à Plestin-les-Grèves (DP).
- *Galium uliginosum* : près de Kergonan à Allineuc (RP & PD) ; Taille de l'Aulnaie-du-Bois en forêt de Lorge à L'Hermitage (JD) ; tourbière de Goarem-Tronjoly à Locarn (JD).

- *Hieracium lactucella* : ancienne voie ferrée à Merdrignac (GP).
- *Hydrocharis morsus-ranae* : amont de l'écluse de Bellevue à Saint-Gelven (MM) ; étang de la Martyre à Saint-Gilles-Vieux-Marché (JD).
- *Matthiola sinuata* : entre Port-l'Épine et Port-le-Goff à Trélévern (YLG).
- *Mycelis muralis* : ancienne abbaye de Bon-Repos à Saint-Gelven (MM).
- *Polypodium cambricum* : face à l'îlot du Pommier à Plouha (DP).
- *Ruppia maritima* : mare salée de Ty-Néwis à Trégastel (PS).
- *Sagittaria sagittifolia* : canal près de Notre-Dame-de-Pitié à Mellionec (PD).
- *Salicornia dolichostachya* : Traou-Martin à Minihi-Tréguier (DP) ; estuaire du Douron à Plestin-les-Grèves (DP) ; le Passage à Pleudaniel (DP) ; terre-plein portuaire de Boured à La Roche-Derrien (DP).
- *Salicornia europaea* : grève de Bonne-Nouvelle à Lanmodez (DP) ; marais maritime de Beg-ar-Vilin à Plougrescant (PH, DP & PS) ; marais maritime du Palud à Plouguiel (PH, DP & PS).
- *Salicornia fragilis* : grève de Bonne-Nouvelle à Lanmodez (DP) ; estuaire du Douron à Plestin-les-Grèves (DP) ; le Passage à Pleudaniel (DP) ; Beg-ar-Vilin à Plougrescant (PH, DP & PS) ; estuaire du Guindy à Plouguiel (DP) ; estuaire du Leff à Plourivo (DP) ; estuaire du Jaudy à Trédarzec (DP).
- *Sarcocornia fruticosa* (= *Arthrocnemum fruticosum*) [nouveau pour les Côtes-d'Armor] : marais maritime du Palus à Plouguiel (DP).
- *Scirpus lacustris* subsp. *lacustris* : canal près de Notre-Dame-de-Pitié à Mellionec (PD) ; étang de Chalonge à Trébédan (MM).
- *Spartina maritima* : marais maritime entre Penn-Vir et Mer-Mélen (DP).
- *Utricularia australis* : étang de Bosreux à Brusvily (MM).
- *Utricularia* gr. *vulgaris-australis* : Kerzoze à Mellionec (CG).
- *Vicia bithynica* : la Fosse-Eyrand à Erquy (RP).

Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels, invasifs)

- *Andryala integrifolia*, originaire d'Europe méridionale : se répand de plus en plus. Après Lannion, Plérin et Yffiniac en 2007, l'espèce a été observée à Caurel, La Motte, Plémet et Trégueux en 2008 (LP & PD).
- *Allium subhirsutum*, originaire d'Europe méridionale : Cesson à Saint-Brieuc (LP, 2007).
- *Aponogeton distachyos*, originaire d'Afrique du Sud [nouveau pour les Côtes-d'Armor] : mare au sud de Trohadiou à Trédarzec (PH & DP).
- *Cotula australis*, originaire d'Australie et Nouvelle-Zélande [nouveau pour les Côtes-d'Armor] : aire de repos de Convent-Guélou à Rospez (DP).
- *Crassula helmsii* (*IA*), originaire d'Australie et Nouvelle-Zélande [nouveau pour les Côtes-d'Armor] : anse de Pellinec à Penvénan (JD).
- *Dianthus barbatus*, originaire d'Europe méridionale [nouveau pour les Côtes-d'Armor] : falaise maritime à Planguenoual (VD).
- *Echium pininana*, originaire des Canaries : en voie de naturalisation à Bréhat et dans le Trégor : Lézardrieux, Penvénan, Pleubian (DP).
- *Epilobium ciliatum* (= *E. adenocaulon*), originaire d'Amérique du Nord : entre Ty-Coz et le pont de Moualhic sur le Douron à Plestin-les-Grèves (DP).
- *Galinsoga ciliata*, originaire d'Amérique du Sud : Moulin de l'Évêque à Minihi-Tréguier (PH).
- *Melilotus indicus*, originaire d'Europe méridionale : secteur de la Croix-Maudez dans l'île de Bréhat (DP & RP) ; pointe de Lanros à Pleubian (DP).
- *Mentha spicata*, probablement d'origine horticole : Toul-Yen à Plestin-les-Grèves (YLG).

- *Pittosporum tenuifolium*, originaire de Nouvelle-Zélande [nouveau pour les Côtes-d'Armor] : semble naturalisé sur l'île Ozac'h à Penvénan (DP).
- *Potentilla recta*, originaire d'Europe méridionale [nouveau pour les Côtes-d'Armor] : talus en bord de route à Tréguier ; sans doute accidentel (DP).
- *Sedum caespitosum*, originaire d'Europe méridionale [nouveau pour les Côtes-d'Armor] : rond-point routier à Ploufragan (VD).
- *Tetragonia tetragonoides*, originaire d'Australie et Nouvelle-Zélande : estuaire du Frémur à Lancieux (VD) ; grève près du Hogolo à Plestin-les-Grèves (DP).

Légende : IA (invasive avérée) en Bretagne.

Observations de : CG : Christophe Guérolé ; DP : Daniel Philippon ; GP : Gwenhael Perrin ; JD : José Durfort ; LP : Laurent Poux ; MC : Michel Colombet ; MH : Marion Hardegen ; MM : Mickaël Mady ; PD : Pierre Danet ; PH : Patrick Hamon ; PP : Pierrick Pustoc'h ; PS : Philippe Sérent ; RP : Rémy Prelli ; VD : Vianney Dalibard ; YLG : Yves Le Gall.

FINISTERE

Liste rédigée par Emmanuel QUERE et Rémy RAGOT

Taxons à statut

- *Asplenium obovatum* subsp. *obovatum* (PR, LRA) : Ouessant (FB & FQ). 2nde localité du Finistère après le Cap Sizun.
- *Bromus grossus* (DH, PN) : Aber à Crozon (MM & RR). Redécouverte de l'espèce en France (signalée dans la région de Brest par J. Lloyd au 19^{ème} siècle).
- *Centaurium maritimum* (LRA) : Trébéron à Crozon (JLB, 2007).
- *Dryopteris aemula* (PN, LRA) : vallée du Squiriou à Plouégat-Moysan (YLG).
- *Eleocharis parvula* (LRA) : bordure de l'Aven à Pont-Aven (YG, 2005). Redécouverte pour le Finistère.
- *Galium parisiense* (LRA) : Saint Trémeur à Plougastel-Daoulas (JLB, 2007).
- *Genista pilosa* (LRA) : Forêt d'Huelgoat (MJ). Découverte pour la Bretagne.
- *Hypericum montanum* (LRA) : pointe de Raguenez (JLB) et l'Aber à Crozon (RR). Redécouverte dans le Finistère.
- *Juncus squarrosus* (LRA) : ardoisières de Commana (TC).
- *Lotus parviflorus* (PR, LRA) : Trébéron à Crozon (JLB, 2007).
- *Ononis reclinata* (LRA) : Ouessant (FB & FQ).
- *Parentucellia latifolia* (PR) : Kersiguénoù à Crozon (JLB, 2007), Penn al Lann à Plougastel-Daoulas (JLB).
- *Pilularia globulifera* (PN, LRA) : Kerfily à Guilers (JLB, 2006).
- *Puccinellia rupestris* (LRA) : Rostellec à Crozon (JLB, 2007).
- *Ranunculus baudotii* (LRA) : Etang de Loc'h Coziou à Trégunc (MM, EQ, LR), Marais de la Joie à Penmarc'h (EQ, LR).
- *Ranunculus tripartitus* (LRA) : Aber à Crozon (JLB).
- *Rumex rupestris* (DH, PN, LRA) : Anse de Kéroullé à l'Hôpital-Camfrout (J-FG).
- *Scutellaria hastifolia* (LRA) : Aber à Crozon (RR). 2nde localité du Finistère.
- *Selinum broteri* (LRA) : Bordure du canal à Landeleau (RR) (troisième localité du département).
- *Serapias cordigera* (PR, LRA) : Ménéham à Kerlouan (AGé). Redécouverte pour la Bretagne.
- *Thalictrum flavum* (LRA) : Loch Louargar à Trégunc (RR). 3^{ème} localité du Finistère.